

ACRIDA Linné, 1758

Acridinae

Gryllus Acrida Linné, 1758, p. 427

Espèce-type : *Gryllus Acrida turrilus* Linné, 1758, p. 427 [Kirby, 1910, p. 90, 92]

Ce genre d'une quarantaine d'espèces, à vaste répartition (afrotropicale, holarctique, orientale et australienne), a été et reste toujours très confus depuis la dernière révision de Dirsh (1954). En dehors de l'aspect purement systématique (identité des espèces d'Afrique de l'Ouest), l'absence de caractères de diagnose précis rend en pratique la séparation des espèces délicate. Il y a donc très probablement de nombreuses confusions y compris dans les inventaires récents.

Quatre espèces seraient présentes dans notre zone selon Dirsh : *A. bicolor*, *A. confusa*, *A. sulphuripennis* et *A. turrila*. Dans l'impossibilité de les distinguer, certaines signalisations regroupent ces espèces. C'est que nous avons indiqué sous l'appellation *Acrida sp.* qui inclut aussi des espèces considérées valides mais a priori non présentes en Afrique de l'Ouest.

u ***Acrida bicolor*** (Thunberg, 1815)

Truxalis bicolor Thunberg, 1815, p. 266, fig. 3

Type mâle, origine inconnue (Afrique du Sud ?, selon Dirsh, 1954), ZI Uppsala. Spécimen désigné par Dirsh (1954, p. 140) comme lectotype.

- Syn.:** *Truxalis pellucida* Klug, 1830, pl. 18. Lectotype (Dirsh, 1949c), illust. Klug, pl. 18 : f. 7, Égypte (holotype MNHU selon DORSA) [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Tryxalis stali Bolívar, 1893a, p. 162, 164. Syntypes mâle(s), femelle(s), Sénégal, Sierra Leone, NR Stockholm selon Johnston, 1956 ; holotype mâle, Sénégal, MNCN Madrid selon Dirsh, 1954, p. 141 [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida orientalis I. Bolívar, 1919, p. 242. Syntypes mâle(s), femelles(s)(holotype mâle selon Dirsh, 1954, p. 141), Éthiopie méridionale, MNHN Paris [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida deminuta I. Bolívar, 1922, p. 183. Holotype mâle, Abyssinie, MNHN Paris [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida tessellata Sjöstedt, 1931b, p. 5. Syntypes mâles (holotype mâle selon Dirsh, 1954, p. 141), Burkina Faso, NR Stockholm [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida leopoldi Sjöstedt, 1934, p. 1-2, fig. 1. Holotype mâle, Zaïre, IRSNB Bruxelles [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida pellucida algeriana Dirsh, 1949c, p. 30, 32. Holotype mâle, Algérie, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida pellucida palaestina Dirsh, 1949c, p. 30, 33. Holotype mâle, Israël, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida pellucida cypria Dirsh, 1949c, p. 30, 34. Holotype mâle, Chypre, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida anatolica Dirsh, 1949c, p. 30, 34. Holotype mâle, Turquie, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida mediterranea mediterranea Dirsh, 1949c, p. 35, 36. Holotype mâle, Italie, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida mediterranea bosphorica Dirsh, 1949c, p. 35, 37. Holotype mâle, Turquie, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida mediterranea lombardica Dirsh, 1949c, p. 35, 38. Holotype mâle, Italie, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]
Acrida meridionalis Ramme, 1951, p. 383. (nom. erratum pour *A. mediterranea*) [Dirsh, 1954, p. 140, avec *Acrida bicolor*]

Cit.: *Acrida bicolor*

- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331 • COPR, 1982, p. 374-375 • Cornes & Riley, 1972, p. 11 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959b, p. 570-571 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1271, 1309 ~ 1967b, p. 656 ~ 1968, p. 561, 564 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 120 • Dirsh, 1954, p. 117 (carte), 140-143 ~ 1965, p. 400-401 ~ 1966, p. 360-362 ~ 1970, p. 393-396 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 350 • Jago, 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 330-331 • Johnsen, 1981a, p. 89 ~ 1981b, p. 154 • Johnston, 1956, p. 655-656 ~ 1968, p. 286 • Kirby, 1910, p. 94 • Launois, 1978b, p. 176-177 • Launois-Luong, 1978a, p. 581-582 ~ 1980b, p. 774-814 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 70 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 642-643, 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 564-566 ~ 1984 ~ 1988, p. 54-55 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 176-177 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 123 • Mestre *et al.*, 2001, p. 319 • Otte, 1995b, p. 240-242 • Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 84 ~ 1977 ~ 1978 • Popov, 1989, p. 90-91 • Popov *et al.*, 1990, p. 96-97 • Roy, 1962, p. 133 ~ 1964b, p. 1187 ~ 1964c, p. 122 ~ 1967, p. 1562 ~ 1969a, p. 214 ~ 1970, p. 700 ~ 1971, p. 405

Acrida pellucida

Chopard, 1950, p. 137

Acrida propinqua (espèce d'Afrique australe, Err. dét. pour *A. bicolor* selon Dirsh, 1954, p. 134).

Burr, 1902, p. 171 • Jago, 1968, p. 331 (*A. propinqua* !) • Johnston, 1956, p. 657

Acrida stali

Burr, 1902, p. 157 (clé), 169-170

Acrida sulphuripennis (Err. dét., = *Tryxalis stali* selon I. Bolívar, 1893a, voir ci-après)


Stål, 1873b, p. 95

Acrida tessellata

Sjöstedt, 1931b, p. 5

Tryxalis stali

I. Bolívar, 1893a, p. 162, 164



Dist.: Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • *mat. exam.*) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Burr, 1902 • Dirsh, 1954, 1966, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Guinée (Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mauritanie (Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1950 • Launois-Luong, 1978a, 1980b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1954, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978) - Nord-Cameroun (Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Sénégal (I. Bolívar, 1893a • Burr, 1902 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1954, 1966 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a,b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1964b, 1967, 1969a, 1970 • *mat. exam.*) - Sierra Leone (I. Bolívar, 1893a • Burr, 1902 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Stål, 1873b) - Tchad (Descamps, 1967b, 1968 • Dirsh, 1954, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mestre, 1988 • Popov, 1989 • Popov *et al.*, 1990)


A. bicolor est citée de toute l'Afrique sub-saharienne ainsi que de plusieurs pays du pourtour méditerranéen.

⊔ *Acrida confusa* Dirsh, 1954

Acrida confusa Dirsh, 1954, p. 131, fig. 4, carte 3
Holotype mâle, Soudan, Gallard forest, NHM Londres

Cit. : *Acrida confusa*

Chapman, 1961, p. 276, 278 ~ 1962, p. 15, 51 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1954, p. 114, 122, 131-132 ~ 1964, p. 67 ~ 1965, p. 400-401 ~ 1970, p. 391-392 • Gillon, 1974a, p. 148 • Johnston, 1968, p. 287 • Lecoq, 1980b, p. 564-566 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 54, 62 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 176-177 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 319 • Otte, 1991, Elle a été 95b, p. 242 • Phipps, 1970, p. 334 • Roy, 1964c, p. 122 ~ 2003, p. 354, 381, 388



Dist.: Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1954, 1965, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Nigeria (Medler, 1980) - Sierra Leone (Dirsh, 1954, 1965, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Togo (Dirsh, 1954, 1965, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Dirsh, 1964 • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988)

Cette espèce est citée de nombreux pays de l'Afrique sub-saharienne.


⊔ *Acrida sulphuripennis* (Gerstäcker, 1869)

Tryxalis sulphuripennis Gerstäcker, 1869, p. 215, fig. 1
Syntypes mâle(s), femelle(s), Zanzibar, NHM Londres

Cit.: *Acrida sulphuripennis*

Chopard, 1958a, p. 145 • COPR, 1982, p. 375 • Cornes & Riley, 1972, p. 11 • Davey *et al.*, 1959b, p. 571 • Descamps, 1965b, p. 1260 • Dirsh, 1954, p. 115, 123, 132-134 ~ 1965, p. 400-401 ~ 1966, p. 359-360 ~ 1970, p. 392-393 • Fishpool & Popov, 1984, p. 350 • Golding, 1946, p. 11, 34 ~ 1948, p. 529 (?) • Jago, 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 331 • Johnsen, 1981a, p. 89 ~ 1981b, p. 154 • Johnston, 1956, p. 658-659 ~ 1968, p. 288 • Karny, 1915, p. 126 • Kirby, 1910, p. 92 • Lecoq, 1980b,

p. 564-566 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 176-177 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Otte, 1995b, p. 244-245 • Popov, 1989, p. 90-91 • Roy, 1964c, p. 122 ~ 2003, p. 353, 381, 388



Dist.: **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1967b • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Karny, 1915 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Liberia** (Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1946, 1948 ? • Jago, 1968 • Medler, 1980) - **Sénégal** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968) - **Sierra Leone** (Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988 • Popov, 1989)

Cette espèce a été assez peu citée dans notre zone d'étude, d'autant qu'un certain nombre de signalisations sont en fait de simples reprises du travail de Dirsh (1954). Le matériel signalé de Sierra Leone par Stål a été rapporté à *T. stali* (devenu *A. bicolor*) par I. Bolívar (1893a).

Cette espèce est citée de nombreux pays de l'Afrique sub-saharienne, descendant jusqu'en Afrique du Sud.

u *Acrida turrita* (Linné, 1758)

Gryllus Acrida turritus Linné, 1758, p. 427

Type "Africa", perdu d'après Dirsh (1949c, p. 24) qui désigne comme localité type l'Algérie. Jago (1996b) parle d'un lectotype femelle au LSC Londres ; ce statut n'est cependant pas indiqué pour ce spécimen par Marshall (1983) dans sa liste des types d'Orthoptéroïdes détenus dans la collection de la Linnean Society of London.

Syn.: *Truxalis rufescens* Palisot de Beauvois, 1805, p. 17, pl. 2 : f. 2. Type Afrique occidentale, dépositaire ? (a priori perdu)

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]

Truxalis tenuis Palisot de Beauvois, 1805, p. 17, pl. 2 : f. 3. Type mâle Afrique occidentale, dépositaire ? (a priori perdu)

[Kiirby, 1910, p. 93, avec *Acrida turrita*]

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]

Tryxalis carinulata I. Bolívar, 1889a, p. 90-91. Type femelle, Îles du Cap-Vert ? ⁽¹⁾, perdu ? selon Dirsh (1954)

[Dirsh, 1966, p. 356, avec *Acrida turrita*]

Acrida turrita uvarovi I. Bolívar, 1936, p. 408-409. Syntypes mâle(s), femelle(s), Maroc, MNCN Madrid

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]

Acrida turrita tunetana Dirsh, 1949c, p. 23, 25. Holotype mâle, Tunisie, NHM Londres

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]

Acrida turrita sicula Dirsh, 1949c, p. 27. Holotype femelle, Sicile, NHM Londres

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]

Acrida maroccana Dirsh, 1949c, p. 21, 27. Holotype mâle, Maroc, NHM Londres

[Dirsh, 1966, p. 356, p. 231, avec *Acrida turrita*]

Acrida maxima Karny, 1907, mise en synonymie avec *A. turrita* par Dirsh & Uvarov (1953b), est admise valide par Jago (1996b).

Cit.: *Acrida carinulata*

Dirsh, 1965, p. 400-401 • Johnston, 1956, p. 656 ~ 1968, p. 286 • Roy, 1964c, p. 121 • Saraiva, 1961, p. 147

Acrida rufescens

Risbec, 1950a, p. 42 ~ 1950b, p. 317 • Stål, 1873b, p. 97

Acrida turrita

Baccetti, 2004, p. 29 • Boisson, 1961, p. 29 • Chapman, 1961, p. 278 ~ 1962, p. 15, 51 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331 • Chopard, 1941, p. 47 ~ 1958a, p. 145 • COPR, 1982, p. 375-376 • Cornes & Riley, 1972, p. 11 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959b, p. 571 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278, 280 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1271, 1309 ~ 1968, p. 561, 564 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 120 • Dirsh, 1954, p. 113, 122, 127-129 ~ 1956c, p. 257, 279, pl. 51, 53 ~ 1963b, p. 215 ~ 1964, p. 67 ~ 1965, p. 400-401 ~ 1966, p. 356-358 ~ 1970, p. 388-391 • Duranton & Lecoq, 1980 • Duranton *et al.*,

⁽¹⁾ I. Bolívar (1889a,b) a cité comme localité de collecte "Cabo Verde" pour différentes espèces. Kevan (1977, p. 250) a considéré, en référence à la même indication pour le Pyrgomorphidae *Phymateus cinctus*, qu'il s'agirait en fait de la presqu'île du Cap Vert au Sénégal et non des îles du Cap-Vert. Cette hypothèse est effectivement étayée par le fait que d'autres espèces citées par Bolívar du même endroit n'ont jamais été retrouvées sur ces îles, dont *Acrida turrita*, alors qu'elles sont présentes au Sénégal (voir notamment Duranton *et al.* 1983, p. 199-201, 210 et 1984, p. 41). A l'inverse cependant, *Oedaleus senegalensis dimidiatus* (I. Bolívar, 1889a, p. 105), sous-espèce strictement cap-verdienne, a la même indication de localité. Il est donc difficile de savoir à partir des informations publiées si toutes les signalisations, avec des récolteurs différents, proviennent bien du même endroit ou s'il peut y avoir eu confusion.

1983, p. 197-207, 213 ~ 1984, p. 41 • Fishpool & Popov, 1984, p. 350 • Gillon, 1974a, p. 148 ~ 1974b, p. 488 • Golding, 1948, p. 529 (?) • Jago, 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 331-332 • Johnsen, 1981a, p. 90 ~ 1981b, p. 154 • Johnston, 1956, p. 659-662 ~ 1968, p. 289 • Karny, 1907, p. 374 ~ 1915, p. 126 • Karsch, 1893, p. 55 • Kirby, 1910, p. 92 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Launois, 1978b, p. 178-179 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 71-72 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 60 ~ 1980b, p. 564-566 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 54, 62 • Mallamaire, 1948, p. 631 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 176-177 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 319 • Otte, 1995b, p. 245 • Oyidi, 1976, p. 84 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 334 • Popov, 1989, p. 88-89 • Popov *et al.*, 1990, p. 98-99 • Roy, 1962, p. 133 ~ 1964b, p. 1179, 1188, 1195 ~ 1964c, p. 122 ~ 1965, p. 627-628 ~ 1966, p. 36 ~ 1967, p. 1562 ~ 1969a, p. 214 ~ 1969b, p. 54 ~ 1971, p. 405-406 ~ 2003, p. 353, 381, 388 • Sjöstedt, 1931b, p. 2 • Zacher, 1917, p. 163

Acrida uvarovi

Chopard, 1950, p. 137 ~ 1952, p. 476

Tryxalis carinulata

I. Bolívar, 1889a • Burr, 1902, p. 163-134

Truxalis rufescens

Palisot de Beauvois, 1805, p. 17, pl. 2 : f. 2.

Truxalis tenuis


Palisot de Beauvois, 1805, p. 17, pl. 2 : f. 3.

Tryxalis rufescens

I. Bolívar, 1893a, p. 162-163 • Mallamaire, 1948, p. 631

Tryxalis turrata

Krauss, 1878, p. 52



Dist.: Bénin (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - Cap-Vert (voir note 1) I. Bolívar, 1889a, 1893a • Burr, 1902 • Dirsh, 1965, 1970 • Saraiva, 1961) - Côte d'Ivoire ((Baccetti, 2004 • COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969b • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1965) - Gambie (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1967b • Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Karny, 1915 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1966) - Liberia (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Boisson, 1961 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1954, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mauritanie (Chopard, 1952 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - Niger (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1950 • Dirsh, 1954 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Comes & Riley, 1972 • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 (?) • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Palisot de Beauvois, 1805) - Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a,b • Krauss, 1878 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1964b, 1964c, 1965, 1967, 1969a,b) - Sierra Leone (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Stål, 1873b) - Tchad (Descamps, 1968 • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Zacher, 1917 • *mat. exam.*) - AO (I. Bolívar, 1893a • COPR, 1982 • Dirsh, 1964 • Fishpool & Popov, 1984 • Karny, 1907 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1980b • Mallamaire, 1948 • Mestre, 1988 • Popov, 1989 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a)

Cette espèce est citée de toute l'Afrique sub-saharienne, au sud du Soudan et de l'Éthiopie, et aussi de la bordure méditerranéenne des pays du Maghreb. La présence au Cap-Vert est à confirmer (voir note 1 page 42), les diverses citations n'étant que des reprises de la signalisation originelle de I. Bolívar.

U *Acrida sp.*

Cit.: *Acrida acuminata* Stål (Err. dét., espèce d'Afrique australe)

I. Bolívar, 1893c, p. 174 • Burr, 1902, p. 162-163 • Karny, 1907, p. 373

Acrida spp.

Descamps, 1953, p. 604 • Fishpool & Popov, 1984, p. 350 (*A. bicolor*, *A. sulphuripennis*, *A. turrata*) • Johnston, 1956, p. 662 ~ 1968, p. 290

Truxalis nasutus (non *Gryllus Acrida nasutus* Linné ; l'excellente figure fournie montre qu'il s'agit d'un *Acrida* que Kirby, 1910, a rapporté à *A. turrata*)

Palisot de Beauvois, 1805, p. 16, pl. 2 : f. 1.

Dist.: Côte d'Ivoire (I. Bolívar, 1893c) - Gambie (I. Bolívar, 1893c • Burr, 1902 • Karny, 1907) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953) - AO (Fishpool & Popov, 1984 • Palisot de Beauvois, 1805)

ACRIDARACHNEA I. Bolívar, 1908

Acridinae

Acridarachnea I. Bolívar, 1908b, p. 418-419

Espèce-type : *Acridarachnea ophthalmica* I. Bolívar, 1908b, p. 419-420

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ ***Acridarachnea ophthalmica*** I. Bolívar, 1908

Acridarachnea ophthalmica I. Bolívar, 1908b, p. 419-420

Holotype mâle, Sénégal, Dakar, dépositaire ? (MNCN Madrid ?)

Cit. : *Acridarachnea ophthalmica*

I. Bolívar, 1908b, p. 419 • Davey *et al.*, 1959b, p. 596 • Descamps, 1965b, p. 1293 ~ 1968, p. 575, 584 • Dirsh, 1951a, p. 145-149 ~ 1956c, p. 281, pl. 60 ~ 1965, p. 505-506 • Fishpool & Popov, 1984, p. 372 • Johnston, 1956, p. 742 ~ 1968, p. 362 • Kirby, 1910, p. 580 • Lecoq, 1980b, p. 578-579 • Medler, 1980, p. 37 (*A. ophthalmica* !) • Mestre, 1988, p. 246-247 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 246 • Popov, 1989, p. 146-147 • Roy, 1964c, p. 123



Dist.: "French Sudan" (Dirsh, 1965) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1951a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964c) - Niger (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Dirsh, 1951a, 1965 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (I. Bolívar, 1908b • Dirsh, 1951a, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Tchad (Descamps, 1968 • Dirsh, 1951a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1980b • Popov, 1989)

Hormis les pays de notre zone d'étude, cette espèce, rarement citée, n'a été signalée que du Soudan.

ACRIDODERES I. Bolívar, 1889

Cyrtacanthacridinae

Acridoderes I. Bolívar, 1889b, p. 163

Espèce-type : *Acridoderes crassus* I. Bolívar, 1889b, p. 163

Syn.: *Phyxacra* Karny, 1907, p. 307-308 [Dirsh, 1966, p. 310, avec *Acridoderes*]

Anacridoderes Uvarov, 1923a, p. 139 [Dirsh, 1958c, p. 56, avec *Acridoderes*]

Genre afrotropical comprenant sept espèces dont deux signalées dans notre zone d'étude.

⊃ ***Acridoderes coerulans*** (Karny, 1907) (? , présence à confirmer)

Phyxacra coerulans Karny, 1907, p. 308

Holotype femelle, Soudan, Gondokoro, NM Vienne

Cit.: *Acridoderes coerulans*

Davey *et al.*, 1959a, p. 93

Phyxacra coerulans

Johnston, 1956, p. 348 • Kirby, 1910, p. 469 (par erreur *P. coeruleus*)

Dist.: Mali (Davey *et al.*, 1959a)

C'est la seule citation pour notre zone d'étude. Il pourrait s'agir en fait de spécimens d'*A. strenuus* avec une pigmentation particulière, cette espèce présentant une grande variabilité chromatique. L'espèce est citée par ailleurs uniquement du Soudan.