

• Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Ramme, 1929)



BAIDOCERACRIS Chopard, 1947

Gomphocerinae

Baidoceracris Chopard, 1947, p. 152

Espèce-type : *Baidoceracris zolotarewskyi* Chopard, 1947, p. 152

Genre afrotropical monospécifique.


⊃ ***Baidoceracris zolotarewskyi*** Chopard, 1947

Baidoceracris zolotarewskyi Chopard, 1947, p. 152

Holotype mâle, Mali, Dia-Diafarabé, MNHN Paris

Cit.: *Baidoceracris zolotarewskyi*

Chapman, 1962, p. 55 • Chopard, 1947, p. 152 • Davey *et al.*, 1959b, p. 591-592 • Descamps, 1965b, p. 1292 • Dirsh, 1958c, p. 62-63 ~ 1965, p. 512-513 • Fishpool & Popov, 1984, p. 406 • Jago, 1967b, p. 250 ~ 1968, p. 342 • Johnston, 1956, p. 720 ~ 1968, p. 368 • Lecoq, 1978b, 243 ~ 1980b, p. 580, 582 • Mestre, 1988, p. 258-259 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 109



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "**French Sudan**" (Dirsh, 1965) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Mali** (Chopard, 1947 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone.

BERENGUERIA I. Bolívar, 1909

Gomphocerinae

Berengueria I. Bolívar, 1909b, p. 296

Espèce-type : *Berengueria rotundifrons* I. Bolívar, 1912b, p. 83 [Uvarov, 1953b, p. 176]

Ce genre afrotropical, qui avait été mis en synonymie avec *Dnopherula* par Dirsh (1958a), a été réhabilité par Jago (1996) qui y inclut trois espèces.

Cet auteur a par ailleurs décrit comme espèce nouvelle *B. cryptica*, très voisine de *B. bifoveolata*, avec qui elle coexiste fréquemment et avait été jusqu'ici confondue. La répartition respective de ces deux espèces devra donc être revue.

⊃ ***Berengueria bifoveolata*** (Karsch, 1893)

Pnorisa bifoveolata Karsch, 1893, p. 65

Syntypes mâles et femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin ?. Lectotype mâle désigné par Hollis (1966, p. 281) et déposé au NHM Londres. Cependant, Jago (1996, p. 74) désigne également comme lectotype le seul spécimen