

BRACHYCROTAPHUS Krauss, 1877

Gomphocerinae

Brachycrotaphus Krauss, 1877, p. 143

Espèce-type : *Brachycrotaphus steindachneri* Krauss, 1877, p. 143

Genre d'une quinzaine d'espèces avec des représentants dans les régions holarctique, afrotropicale et orientale. Malgré la révision d'Uvarov (1932c), il semble qu'il y ait eu un certain nombre de confusions dans la détermination des espèces, et ceci même pour des espèces assez facilement identifiables avec la clé d'Uvarov (mâles uniquement). Un réexamen de ce genre et des répartitions géographiques est indispensable.


⊔ *Brachycrotaphus buettneri* Karsch, 1896

Brachycrotaphus buettneri Karsch, 1896, p. 261-262, fig. 9, 9b

Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckburg et Misahöhe, MNHU Berlin. Lectotype mâle, Bismarckburg, MNHU Berlin, désigné par Uvarov (1932b, p. 298) (DORSA : + 5 paralectotypes, 1 mâle et 4 femelles))

Cit.: *Brachycrotaphus buettneri* ou *büttneri*

Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Dirsh, 1963b, p. 219 ~ 1964, p. 80 ~ 1965, p. 513-514 ~ 1970, p. 542 • Fishpool & Popov, 1984, p. 407 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 163-164, 170, 172-174 ~ 1974b, p. 511, 522, 525 ~ 1976, p. 5-85 • Jago, 1967b, p. 266 ~ 1968, p. 343 • Johnston, 1956, p. 722 ~ 1968, p. 369 • Karsch, 1896, p. 261-262 • Kirby, 1910, p. 149 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 57, 62 • Mestre, 1988, p. 260-261, 288 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 111 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 343 • Roy, 2003, p. 375, 381, 389 • Uvarov, 1932b, p. 287, 290, 292, 295, 297-298



Dist.: Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1976 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • *mat. exam.*) - Togo (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1896 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1932b • *mat. exam.*)

L'espèce est également signalée du Cameroun et du Zaïre.


⊔ *Brachycrotaphus karschi* Uvarov, 1926

Brachycrotaphus karschi Uvarov, 1926a, p. 416-417

Holotype mâle, Nord-Nigeria, Azare (*en fait Sherifuri, 40 km au nord*), NHM Londres

Cit.: *Brachycrotaphus karschi*

Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959b, p. 592-593 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1965b, p. 1292, 1306 • Dirsh, 1965, p. 513-514 • Durantou & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 407 • Golding, 1948, p. 533 • Jago, 1967b, p. 240, 265 ~ 1968, p. 345 • Johnston, 1956, p. 722-723 ~ 1968, p. 369 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 69 ~ 1980b, p. 580, 582-583 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 260-261, 288 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 112 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Risbec, 1950b, p. 364 • Uvarov, 1926a, p. 416-417 ~ 1932b, p. 287, 290, 292, 295-296, 298



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a, 1932b) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Lecoq, 1978b, 1980b • Risbec, 1950b)

L'espèce est signalée uniquement de notre zone d'étude.

U *Brachycrotaphus lloydi* Uvarov, 1926


Brachycrotaphus lloydi Uvarov, 1926a, p. 417

Holotype mâle, Nord-Nigeria, Azare (*en fait Sherifuri, 40 km au nord*), NHM Londres

Dans sa description, Uvarov décrit un mâle puis une femelle provenant d'une série de 2 mâles et 2 femelles d'Azare et d'un mâle de Garoua (Nord-Cameroun). Dans le texte, rien ne précise d'où provient le mâle type. C'est dans sa révision du genre en 1932 qu'Uvarov indique que le mâle type est d'Azare.

Cit.: *Brachycrotaphus lloydi*

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331-332 • Chopard, 1958a, p. 147 • Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Davey *et al.*, 1959b, p. 593 • Descamps, 1965b, p. 1292, 1306 • Dirsh, 1964, p. 80 ~ 1965, p. 513-514 ~ 1970, p. 542 • Fishpool & Popov, 1984, p. 374 • Golding, 1948, p. 533 • Johnsen, 1981a, p. 95-96 • Johnston, 1956, p. 723 ~ 1968, p. 369 • Lecoq, 1980b, p. 580, 582-583 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 262-263, 288 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 112 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 343 • Uvarov, 1926a, p. 417 ~ 1932b, p. 287, 290, 292, 296-297



Dist.: Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Chopard, 1958a) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) • Nigeria (Chopard, 1958a • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1926a, 1932b) - Nord-Cameroun (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1926a, 1932b) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - "Soudan français" (Chopard, 1958a) - Tchad (Uvarov, 1932b) - AO (Lecoq, 1980b)

L'espèce est également signalée du Cameroun et du Zaïre.


U *Brachycrotaphus longicornis* Jago, 1966

Brachycrotaphus longicornis Jago, 1966b, p. 368, fig. 47-54

Holotype mâle, Ghana, Northern region, 4 miles North of Mole River, Busunu-Doboye Road, NHM Londres

Cit.: *Brachycrotaphus longicornis*

Jago, 1966b, p. 366-371 ~ 1967b, p. 240, 265 ~ 1968, p. 345 • Johnston, 1968, p. 369 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 112



Dist.: Ghana (Jago, 1966b, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997)


Le matériel-type est la seule signalisation de l'espèce.

⊔ ***Brachycrotaphus nigericus* Chopard, 1947**

Brachycrotaphus nigericus Chopard, 1947, p. 152-153
Holotype mâle, Niger, Niamey, MNHN Paris

Cit.: *Brachycrotaphus nigericus*

Chopard, 1947, p. 152-153 • Dirsh, 1965, p. 513-514 • Johnston, 1956, p.723 • Lecoq, 1980b, p. 580, 582 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 57-58, 61 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 112



Dist.: Niger (Chopard, 1947 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1980b)


La validité de cette espèce, citée uniquement par le type du Niger (Niamey), est très douteuse (voir Chiffaud & Mestre, 1992). La signalisation de Côte d'Ivoire (Le Gall & Mestre, 1986) est une erreur, probablement pour *B. tryxalicerus*.

⊔ ***Brachycrotaphus rammei* Uvarov, 1932**

Brachycrotaphus rammei Uvarov, 1932b, p. 298, fig. 3r, 4r, 6r, 7r
Holotype mâle, Centrafrique, Bosum, MNHU Berlin (DORSA : + 1 paralectotype femelle)

Cit.: *Brachycrotaphus rammei*

Davey *et al.*, 1959b, p. 593 • Descamps, 1965b, p. 1292 • Dirsh, 1965, p. 514 • Johnston, 1968, p. 370 • Lecoq, 1980b, p. 580, 582-583 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 112 • Uvarov, 1932b, p. 290, 292, 295, 296, 298-299



Dist.: Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1980b)

Ces signalisations doivent à notre avis être confirmées. Hors ces citations, l'espèce n'a été signalée que de Centrafrique.

⊔ ***Brachycrotaphus steindachneri* Krauss, 1877**

Brachycrotaphus steindachneri Krauss, 1877, p. 143 [1878, p. 48-49, pl. 2 : fig. 15, 15a]
Syntypes mâles, Sénégal, Dagana, NM Vienne

Cette espèce a été mise en synonymie avec *B. tryxalicerus* par Dirsh (1966), ce qu'avait également fait Kirby (1910). Elles sont pourtant clairement et facilement distinguables d'après la révision d'Uvarov (1932)(voir aussi Mestre, 1988). Les citations où les deux espèces ont été mises en synonymie sont indiquées sous le nom *B. tryxalicerus*.

Cit.: *Brachycrotaphus steindachneri*


Chapman, 1961, p. 279 ~ 1962, p. 55, 62 • Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Davey *et al.*, 1959b, p. 593 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p. 1292, 1306-1307 • Dirsh, 1965, p. 513-514 • Fishpool & Popov, 1984, p. 374, 385 • Golding, 1948, p. 534, 578-584 • Jago, 1967b, p. 240, 265 ~ 1968, p. 343-344 • Johnston, 1956, p. 724 ~ 1968, p. 370 • Krauss, 1877, p. 143 ~ 1878, p. 48-49 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 580, 582-583 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 262-263, 288 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 112 • Oyidi, 1976, p. 89 ~ 1977 ~ 1978 • Popov, 1989, p. 150-151 • Roy, 1962, p. 134 • Uvarov, 1932b, p. 287, 289 (clé), 292, 293-295 ~ 1953, p. 198

Brachycrotaphus tryxalicerus (synonymie incorrecte)

Dirsh, 1966, p. 466-468 ~ 1970, p. 540-541 • Kirby, 1910, p. 149

Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Lecoq, 1977, 1978a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Golding, 1948) - Ghana (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh,

1965 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1932b, 1953 • *mat. exam.*) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Comes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1932b, 1953) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962 • Uvarov, 1932b) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)



Cette espèce est également signalée du Soudan, d'Ouganda et du Zimbabwe.

U *Brachycrotaphus tryxalicerus* (Fischer, 1853)

Opomala tryxalicerus Fischer, 1853, p. 305-306, pl. 15 : fig. 8

Type femelle, Sicile, prope Messanam, perdu selon Dirsh (1966, p. 468)

Syn.: *Ochrilidia boscae* Cazorro y Ruiz, 1886, p. 112-114. Syntypes mâle(s), femelle(s), Espagne, MNCN Madrid

[Uvarov, 1932b, p. 291, avec *Brachycrotaphus tryxalicerus*]

Brachycrotaphus stuhlmanni Karsch, 1896, p. 262-263. Lectotype mâle (Uvarov, 1932b), French Equatorial Africa, N. Alb. Edw.-See, Jssango-Ebene, MNHU Berlin ? (DORSA : non recensé)

[Sjöstedt, 1909, p. 159, avec *Brachycrotaphus truxalicerus* (!)(= *tryxalicerus*)]

Ochrilidia bitaeniata I. Bolívar, 1908c, p. 97-98 Type femelle, Zaïre, IRSNB Bruxelles

[Uvarov, 1932b, p. 291, avec *Brachycrotaphus tryxalicerus*]

Cit.: *Brachycrotaphus tryxalicerus* (-a)


Chapman, 1961, p. 278 ~ 1962, p. 55-56, 62 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331-332, 334 • Chopard, 1958c, p. 16 • Comes & Riley, 1972, p. 14 • Dahdoh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959b, p. 593-594 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p. 1292, 1307, 1310 ~ 1968, p. 575, 583 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 127 • Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 60 ~ 1965, p. 513-514 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207, 221 ~ 1984, p. 39, 41 • Fishpool & Popov, 1984, p. 375, 385 • Golding, 1948, p. 534 • Jago, 1967b, p. 240, 265 ~ 1968, p. 344-345 • Johnsen, 1971, p. 46, 47, 48 ~ 1981a, p. 95 • Johnston, 1956, p. 724-725 ~ 1968, p. 370 • Launois, 1978b, p. 254-255 • Launois *et al.*, 1988, p. 159 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 104-105 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 69 ~ 1980b, p. 580, 582-583 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 262-263, 288 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Oyidi, 1976, p. 89 ~ 1977 ~ 1978 • Popov, 1989, p. 150-151 • Roy, 1971, p. 409 • Saraiva, 1961, p. 148 • Uvarov, 1926a, p. 416 ~ 1932b, p. 287, 289 (clé), 291-293, 294, 295

Brachycrotaphus tryxalicerus (citations où *B. steindachneri* était considéré synonyme)

COPR, 1982, p. 518-519 • Dirsh, 1966, p. 466-468 ~ 1970, p. 540-541 • Kirby, 1910, p. 149 • Roy, 1969a, p. 219

Ochrilidia tryxalicerus

Karny, 1907, p. 366, 367 ~ 1915, p. 126 • Karsch, 1893, p. 61-62



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Dahdoh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Cap-Vert** (Chopard, 1958c • COPR, 1982 • Duranton *et al.*, 1984 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saraiva, 1961) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) -

"French Sudan" (Golding, 1948) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1932b • *mat. exam.*) - **Guinée** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karny, 1915) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a, 1932b) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1932b) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a • Uvarov, 1932b) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Dirsh, 1966, 1970 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce a été citée de nombreux pays d'Afrique sub-saharienne. Au-delà, outre la Sicile (et les îles Liparies), elle n'est citée que de l'Espagne mais n'a cependant jamais été signalée d'Afrique du Nord.

U *Brachycrotaphus* sp.

Cit.: *Brachycrotaphus* sp.
Descamps & Le Breton, 1973, p. 127 • Phipps, 1970, p. 344

Dist.: **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973) - **Sierra Leone** (Phipps, 1970)

BRYOPHYMA Uvarov, 1923

Cyrtacanthacridinae

Bryophyma Uvarov, 1923a, p. 141

Espèce-type : *Cyrtacanthacris debilis* Karsch, 1896, p. 300

Syn.: *Rhytidacris* Uvarov, 1923a, p. 141 [Dirsh, 1966, p. 314, avec *Bryophyma*]


Genre afrotropical comprenant deux espèces. Il a de grandes affinités avec *Acridoderes* si tant est que leur séparation soit fondée.

U *Bryophyma decipiens* (Karsch, 1896)

Cyrtacanthacris decipiens Karsch, 1896, p. 298-299, fig. 23

Syntypes mâle(s), femelle(s), Togo, Misahöhe, MNHU Berlin. Lectotype mâle désigné par Mestre (2001) (DORSA : 2 syntypes, un mâle et une femelle).

Cette espèce n'avait été longtemps citée que par le matériel type du Togo. Même si elle paraît peu commune ou localisée, cette apparente rareté résulte également du fait qu'elle avait été jusqu'ici mal identifiée sous le nom de *Bryophyma debilis*, espèce d'Afrique centrale (Mestre, 2001).



Cit.: *Acridium decipiens*

Finot, 1907, p. 330

Bryophyma decipiens

Mestre, 2001, p. 487-488

Bryophyma debilis (Err. dét. selon Mestre, 2001, p. 487-488)

Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Dirsh, 1965, p. 378, 379 ~ 1966, p. 315-316 ~ 1970, p. 345-347 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 397 • Launois-Luong *et al.*, 1999, p. 344-347 • Lecoq, 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 59 ~ 1980b, p. 560, 562 ~ 1984 • Luong-Skovmand & Balança, 2000, p. 110-118 • Luong-Skovmand & Foucart, 2000, p. 103-109 • Mestre, 1988, p. 162-163 • Mestre, 2001, p. 487-488 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Uvarov, 1923a, p. 136

Bryophyma debilis picta (Err. dét. selon Mestre, 2001, p. 487-488)

Forsyth, 1966, p. 96 • Johnston, 1968, p. 271

Rhytidacris sp. 1

Lecoq, 1977, p. 6

Cyrtacanthacris decipiens

Dirsh, 1965, p. 385 ~ 1979, p. 40 • Jago, 1968, p. 277 • Johnston, 1956, p. 379 • Karsch, 1896, p. 298-299 • Kirby, 1910, p. 453 • Mestre, 2001, p. 487-488 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123