

⊔ *Eyrepocnemis schulzei* Roy, 1964

*Eyrepocnemis schulzei* Roy, 1964a, p.1164-1167, fig. 10-12

Holotype mâle, allotype femelle, Sierra Leone, Mont Bintumane (Monts Loma), MNHN Paris

**Cit.:** *Eyrepocnemis schulzei*

Jaeger *et al.*, 1966, p. 1183 • Johnston, 1968, p. 209 • Mestre, 1988, p. 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Otte, 1995a, p. 181 • Roy, 1964a, p. 1155, 1164-1167 ~ 1966, p. 38



**Dist.:** Sierra Leone (Jaeger *et al.*, 1966 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 1966 • *mat. exam.*)

Cette espèce brachyptère n'est signalée que des monts Loma.

**EYREPOCPRIFAS** Donskoff, 1983

Eyrepocnemidinae

*Eyrepocprifas* Donskoff, 1983, p. 345-346

Espèce-type : *Eyrepocprifas insularis* Donskoff, 1983, p. 346

Genre monospécifique, connu jusqu'ici uniquement des îles du Cap-Vert.

⊔ *Eyrepocprifas insularis* Donskoff, 1983

*Eyrepocprifas insularis* Donskoff, 1983, p. 345-348, fig. 1, 2-11

Holotype mâle, îles du Cap-Vert, San Nicolau, MNHN Paris

**Cit.:** *Eyrepocprifas insularis*

Donskoff, 1983, p. 345-348 • Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207, 212-213 ~ 1984, p. 41-42 • Launois *et al.*, 1988, p. 157 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Otte, 1995a, p. 181

**Dist.:** Cap-Vert (Donskoff, 1983 • Duranton *et al.*, 1983, 1984 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997)

C'est la seule signalisation de cette espèce brachyptère, décrite à partir d'un unique mâle.

**FAUREIA** Uvarov, 1921

Gomphocerinae

*Faureia* Uvarov, 1921c, p. 389

Espèce-type : *Faureia rosea* Uvarov, 1921c, p. 391

Syn.: *Ugandella* Sjöstedt, 1923a, p. 18 [Uvarov, 1934c, p. 605, avec *Faureia*]

Genre afrotropical comprenant trois espèces en incluant *F. vittigera* (Karsch), espèce à l'origine décrite dans le genre *Pnorisa*.

⊔ *Faureia milanjica* (Karsch, 1896)

*Rhaphotittha milanjica* Karsch, 1896, p. 258-259

Holotype femelle, territorium Nyassa (= Malawi), Milanji (= Milange, Mozambique), MNHU Berlin (DORSA : holotype)

L'holotype porte l'étiquette suivante : "Synonym mit *Pnorisa vittigera* Karsch und gehört zu *Faureia* Uv., Det. B. Uvarov 1925". Cette synonymie n'a jamais été publiée. Si elle était exacte, *F. vittigera*, qui a priorité, serait la seule présente en Afrique de l'Ouest (voir ci-après).

**Syn.:** *Faureia rosea* Uvarov, 1921c, p. 391-392. Holotype mâle, Afrique du Sud, NHM Londres

[Dirsh, 1966, p. 501, avec *Faureia milanjica*]

*Ugandella subparallela* Sjöstedt, 1923a, p. 20 (non *Chortoicetes subparallelus* Rehn). Syntypes mâles, femelles, Uganda et Zaïre, dépositaire ?

[Uvarov, 1953b, p. 172, avec *Faureia milanjica*]

*Faureia milanjica* var. *coerulescens* Miller, 1929, p. 71. Syntypes mâles, femelles, Tanzanie, NHM Londres

[Dirsh, 1966, p. 501, avec *Faureia milanjica*]

*Rhaphotittha flavipennis* Sjöstedt, 1929a, p. 6-8, 40. Type mâle, Zaïre, NM Vienne

[Hollis, 1966, p. 327, avec *Faureia milanjica*]