

Cit.: *Faureia coerulescens*

Dirsh, 1963b, p. 219 ~ 1965, p. 548-549 • Jago, 1968, p. 337 • Johnston, 1968, p. 392 • Phipps, 1971

Faureia milanjica

Chapman, 1962, p. 54 • COPR, 1982, p. 530-532 • Davey *et al.*, 1959b, p. 587 • Descamps, 1965b, p. 1292 • Dirsh, 1965, p. 548-549 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 168 ~ 1974b, p. 516, 520-521, 527 • Fishpool & Popov, 1984, p. 409 • Jago, 1967b, p. 257 ~ 1968, 336-337 • Johnston, 1968, p. 392 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 581, 589 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 57, 62 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 286-287 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 325 • Otte, 1995b, p. 165-166 • Phipps, 1970, p. 345 • Roy, 2003, p. 377, 389, 381, fig. 30

Rhaphotittha milanjica

Kirby, 1910, p. 151

D'après Jago (1968), les *Faureia coerulescens* cités par Chapman (1962) étaient en fait des *Spathosternum nigrotaeniatum*.



Dist.: Côte d'Ivoire (Gillon, 1971, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Guinée (COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970 • *mat. exam.*) - Togo (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce est également signalée de la partie centrale et orientale du continent, depuis le Zaïre jusqu'en Afrique du Sud.

u *Faureia vittigera* (Karsch, 1893) **comb. nov.**

Pnorisa vittigera Karsch, 1893, p. 66

Holotype mâle, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : + paratype femelle)

Les photographies du type disponibles sur Internet (Dorsa / SysTax) montrent clairement que cette espèce doit être rattachée au genre *Faureia*. Uvarov l'avait déjà remarqué puisqu'une étiquette du type indique "genus *Faureia* Uv. = *Ugandella* Sjöst., det. B. Uvarov, 1925", synonymie générique publiée en 1934.

Il paraît probable que cette espèce soit de plus la même que ce qui a été appelé *F. milanjica* en Afrique de l'Ouest mais seul l'examen du type permettra de le confirmer. Uvarov avait par ailleurs envisagé, sans le publier, la synonymie des deux taxons (voir ci-avant *F. milanjica*).

Cit.: *Pnorisa vittigera*

Dirsh, 1965, p. 539 • Jago, 1968, p. 339 • Johnston, 1956, p. 677 • Karsch, 1893, p. 65, 66 • Kirby, 1910, p. 151 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 211



Dist.: Togo (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Le type est la seule signalisation de cette espèce.

GALEICLES Descamps, 1977

Afromastacinae

Galeicles Descamps, 1977, p. 148, 150


Espèce-type : *Galeicles teocchi* Descamps, 1977

Genre afrotropical comprenant trois petites espèces, aptères comme tous les Thericleidae (hormis la tribu des Plagiotriptini).

⊔ ***Galeicles kooymani*** Popov, 1996

Galeicles kooymani Popov, 1996, p. 43-44
Holotype mâle, Tchad, Handa Park, nr. Sarh, NHM Londres

Cit.: *Galeicles kooymani*
Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Popov, 1996, p. 43-44




Dist.: Tchad (Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov, 1996)
C'est la seule signalisation de cette espèce récemment décrite.

⊔ ***Galeicles parvulus*** Descamps, 1977

Galeicles parvulus Descamps, 1977, p. 151, fig. 486-490
Holotype mâle, Cameroun, Batouri, NHM Londres

Cit.: *Galeicles parvulus*
Descamps, 1977, p. 151, fig. 486-490



Dist.: Tchad (Descamps, 1977)
Cette espèce est également citée du Cameroun et du Zaïre.

GASTRIMARGUS Saussure, 1884

Oedipodinae

Oedaleus (Gastrimargus) Saussure, 1884, p. 109 (clé), 110-111

Espèce-type : *Gryllus virescens* Thunberg, 1815, p. 109, 110 (= *G. marmoratus* Thunberg) [Kirby, 1910, p. 226]

De nombreuses espèces de *Gastrimargus* avaient été décrites, en particulier par Sjöstedt (1928), et la situation est restée longtemps confuse dans ce genre. La révision de Ritchie (1982) a conduit à admettre une vingtaine d'espèces afrotropicales, orientales et australiennes. Trois espèces sont présentes en Afrique de l'Ouest : *G. africanus africanus*, *G. determinatus procerus* et *G. ochraceus*.

⊔ ***Gastrimargus africanus africanus*** (Saussure, 1888)

Oedaleus (Gastrimargus) marmoratus var. *africana* Saussure, 1888, p. 39

Syntypes mâle(s), femelle(s), Afrique méridionale. Lectotype mâle, MHN Genève, désigné par Ritchie (1982, p. 248), mais Dirsh (1970, p. 491) signalait déjà un lectotype mâle d'Afrique du Sud.

Syn.: *Gastrimargus africanus* var. *zebrata* Sjöstedt 1928, p. 41, pl. 8 : f. 3-5. Holotype femelle, Tanzanie, NR Stockholm [Dirsh, 1966, p. 426, avec *Gastrimargus africanus*]

Gastrimargus africanus var. *orientalis* Sjöstedt, 1928, p. 41, pl. 8 : f. 6-7. Holotype femelle, Ceylan (= Sri Lanka), MHN Genève [Ritchie, 1982, p. 248, avec *Gastrimargus africanus africanus*]

Cit.: *Gastrimargus africanus*

Chapman, 1961, p. 274 ~ 1962, p. 14, 40-41, 61 • Chopard, 1958a, p. 143 • COPR, 1982, p. 442-444 • Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959b, p. 581-582 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1953, p. 597-598, 604, 607 ~ 1954, p. 178 ~ 1962b, p. 198, 201, 210 ~ 1965b, p. 1260, 1282-1284, 1310 ~ 1967b, p. 656 ~ 1968, p. 561, 573 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 124 • Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 58 ~ 1963b, p. 218 ~ 1964, p.74 ~ 1965, p. 481, 482 ~