

PARAPROPACRIS Ramme, 1929

Catantopinae

Parapropacris Ramme, 1929, p. 402

Espèce-type : *Stenocroblylus rhodopterus* Uvarov, 1923, p. 684

Syn.: *Anacatantops* Dirsh, 1953, p. 232 [Jago, 1984, p. 351, avec *Parapropacris*]

Genre afrotropical comprenant quatre espèces selon Jago (1984).

⊂ ***Parapropacris notata*** (Karsch, 1891)

Catantops notatus Karsch, 1891, p. 190

Syntypes mâle(s), femelle(s), Cameroun, Barombi-Station et Kribi, MNHU Berlin. Lectotype mâle, désigné par Jago (1984, p. 351). Cependant, Dirsh (1970, p. 298) parle aussi d'un lectotype mâle. (DORSA : + 3 paralectotypes)

Syn.: *Catantops karschi* Karny, 1907, p. 316, 337. Lectotype femelle (Dirsh, 1956a), Cameroun, NM Vienne [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]

Catantops minimus Karny, 1907, p. 320, 344-345. Syntypes femelles, Soudan, NM Vienne [Sjöstedt, 1931a, p. 30-31, avec *Catantops notatus*]

Catantops kraussi Karny, 1907, p. 321, 345-346. Syntypes mâle(s), femelles, Ghana, NM Vienne [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]


Catantops bipunctatus l. Bolívar, 1908c, p. 123. Syntypes mâles, femelles, Zaïre, MNCN Madrid [Ramme, 1929, p. 436, avec *Anacatantops notatus bipunctatus*]

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]

Catantops simplex Uvarov, 1923c, p. 687-689. Holotype mâle, Ouganda, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]

Catantops frater Ramme, 1929, p. 437-438. Holotype mâle, Zaïre, MRAC Tervuren [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]

Nous n'avons pas retenu la synonymie faite par Descamps & Donskoff (1968, p. 1215) faisant de *Catantopsilus angulatus* Descamps, 1965, un synonyme de cette espèce. Ainsi qu'indiqué dans Mestre & Chiffaud (1997), *C. angulatus*, dont nous avons examiné le type au Muséum de Paris, est clairement une espèce différente appartenant au genre *Catantopsilus*.



Cit.: *Anacatantops notatus*

Chapman, 1962, p. 12, 28 • Chopard, 1958a, p. 136 • COPR, 1982, p. 272-273 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Davey *et al.*, 1959a, p. 92 • Descamps, 1965a, p. 953 ~ 1968, p. 556, 558 • Dirsh, 1956a, p. 30-31 ~ 1956c, p. 275 ~ 1963b, p. 213 ~ 1964, p. 64 ~ 1965, p. 360, 361 ~ 1966, p. 267-269 ~ 1970, p. 296-299 • Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232 • Fishpool & Popov, 1984, p. 395 • Gillon, 1974a, p. 146 ~ 1974b, p. 483, 528 • Jago, 1964a, p. 198 ~ 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 263-264 • Johnsen, 1971, p. 36, 37, 38 • Johnston, 1956, p. 328-329 ~ 1968, p. 253-254 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 58 ~ 1980b, p. 555, 557 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 38 • Oyidi, 1976, p. 88 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1971 • Roy, 1969a, p. 213 • Vesey-Fitzgerald, p. 356

Catantops kraussi

Karny, 1907, p. 321, 345-346 ~ 1915, p. 140

Catantops minimus

Golding, 1946, p. 8, 34 ~ p. 1948, p. 469 • Jacques-Félix, 1935, p. 42-43, fig. • Uvarov, 1926a, p. 449

Catantops notatus

Descamps, 1953, p. 605 • Golding, 1948, p. 469 • Karny, 1907, p. 321, 346 • Kirby, 1910, p. 480 • Ramme, 1929, p. 436-437, 484 • Sjöstedt, 1931a, p. 30-31 ~ 1931b, p. 30

Catantops simplex


Golding, 1940b, p. 130 ~ 1946, p. 8, 34 ~ 1948, p. 569, 578-584

Parapropacris notata (-us)

Baccetti, 2004, p. 29 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Jago, 1984, p. 350-352 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Mestre, 1988, p. 146-147 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 317 • Otte, 1995a, p. 324-325 • Phipps, 1970, p. 330

Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Baccetti, 2004 • COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Jago, 1967b, 1968 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • Ramme, 1929 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Golding, 1948 • Jacques-Félix, 1935 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) -

Liberia (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1940b, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - **Sierra Leone** (Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1968, 1970, 1971) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Kamy, 1907 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Ramme, 1929 • Sjöstedt, 1931a • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b)



L'espèce s'étend vers l'est jusqu'au Kenya et à la Tanzanie.

PARGA Walker, 1870

Acridinae

Parga Walker, 1870a, p. 504-505

Espèce-type : *Amycus xanthopterus* Stål, 1855, p. 353 [Burr, 1902, p. 185, pour le genre *Amycus*]

Syn.: *Amycus* Stål, 1855, p. 353 (nom. praeoc.) [I. Bolívar, 1906, p. 391, *Parga*, nom. subst.]

Ce genre afrotropical est très confus et une révision s'impose. De nombreuses espèces peu caractérisées ont été décrites par Sjöstedt (1931b), dont trois de la même localité du Burkina Faso, et beaucoup d'entre elles ne sont certainement pas valides.

Hormis *Parga lamottei*, nouvelle espèce décrite en 1947 de Guinée, la plupart des auteurs n'ont, après 1931, cité que *Parga cyanoptera* pour l'Afrique de l'Ouest, et les diverses espèces ou formes décrites par Sjöstedt n'ont presque jamais été signalées.

⊔ *Parga albovittata* Sjöstedt, 1931

Parga albovittata Sjöstedt, 1931a, p. 62, pl. 1 : f. 1

Syntypes mâle(s), femelle(s), Burkina Faso, Pundu, NR Stockholm

Cit.: *Parga albovittata*

Dirsh, 1965, p. 404 • Johnston, 1956, p. 636 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 298 • Sjöstedt, 1931a, p. 62 ~ 1931b, p. 17, 19, 20



Dist.: Burkina Faso (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931a,b)

C'est la seule signalisation de l'espèce.

⊔ *Parga bissauensis* Sjöstedt, 1931

Parga bissauensis Sjöstedt, 1931b, p. 13, fig. 3

Holotype femelle, Guinée-Bissau, Bissau, MNHU Berlin (DORSA : holotype)

Cit.: *Parga bissauensis*

Dirsh, 1965, p. 404 • Johnston, 1956, p. 636 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 298 • Sjöstedt, 1931b, p. 9, 13, 18

Dist.: Guinée-Bissau (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b).