

*Pseudogmothela* sp.

Mestre *et al.*, 2001, p. 326 (*mat. exam.*)

**Dist.:** Bénin (Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Ghana (Roy, 2002) - Mali (Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Niger (Roy, 2002) - Nigeria (Roy, 2002) - Nord-Cameroun (Roy, 2002) - Togo (Roy, 2002 • *mat. exam.*)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊔ *Pseudogmothela yonlii* Roy, 2002

*Pseudogmothela yonlii* Roy, 2002, p. 6, 7, 8-10

Holotype mâle, Burkina Faso, Kamboinsé (12 km au nord de Ouagadougou), MNHN Paris

**Cit.:** *Pseudogmothela foveolata* (Err. dét., *mat. exam.*)

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 335 • Mestre, 1988, p. 275 (illustration femelle) • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 (partie, matériel du Niger)

*Pseudogmothela yonlii*

Roy, 2002, p. 6, 7, 8-10



**Dist.:** Burkina Faso (Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Ghana (Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Nigeria (Roy, 2002)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊔ *Pseudogmothela* sp. (= *P. foveolata*, *P. jagoi* ou *P. yonlii*)

**Cit.:** *Pseudogmothela foveolata*

Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps, 1965b, p. 1292, 1295-1296 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 380 • Jago, 1966b, p. 352-353, 355-357 ~ 1967b, p. 246 ~ 1968, p. 339 • Johnston, 1968, p. 382 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 70 ~ 1980b, p. 581, 588 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 274-275 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 215 • Oyidi, 1977 ~ 1978

**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Jago, 1966b, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965b • Jago, 1966b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - Sénégal (Jago, 1966b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

**PSEUDOPHIALOSPHERA** Dirsh, 1952

Catantopinae

*Pseudophialosphaera* Dirsh, 1952, p. 264-266

Espèce-type : *Phialosphaera tectifera* Ramme, 1929, p. 374, 375

Genre afrotropical comprenant trois espèces forestières. Dirsh (1970, p. 241) le cite comme synonyme d'*Antita* I. Bolívar, 1908 (Hollis, *in litt.*) mais cette synonymie a été ignorée.

⊔ *Pseudophialosphaera sylvatica* (Chapman, 1960)

*Apoboleus sylvaticus* Chapman, 1960, p. 242, fig. 4-9

Holotype mâle, Est-Ghana, Réserve forestière d'Essuboni, NHM Londres


**Cit.:** *Apoboleus sylvaticus*

Chapman, 1960, p. 242 ~ 1962, p. 24, 60 ~ 1964, p. 120 • Dirsh, 1965, p. 330, 331

*Pseudophialosphaera sylvatica*

Jago, 1966b, p. 344-345 ~ 1967b, p. 247 ~ 1968, p. 252-253 • Johnston, 1968, p. 234 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Otte, 1995a, p. 208

**Dist.:** Ghana (Chapman, 1960, 1962 • Dirsh, 1965 • Jago, 1966b, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997)



Cette espèce brachyptère et forestière n'est signalée jusqu'ici que du Ghana.

**PTEROTILTUS** Karsch, 1893

Oxyinae

*Pterotiltus* Karsch, 1893, p. 108

Espèce-type : *Pygostolus impennis* Karsch, 1891, p. 193-194

Syn.: *Pygostolus* Karsch, 1891, p. 192 (nom. praeoc) [Karsch, 1893, p. 108, avec *Pterotiltus*, nom. nov.]

Genre afrotropical d'une dizaine d'espèces à élytres vestigiaux, connues des forêts du Sud-Cameroun, Congo et Ouest-Zaïre.

⊃ *Pterotiltus inuncatus* (Karsch, 1892) (? , présence à confirmer)

*Pygostolus inuncatus* Karsch, 1892, p. 72-73

Syntypes mâles, femelle, Cameroun, Buea, MNHU Berlin (DORSA : 6 syntypes mâles)

**Cit.:** *Pterotiltus inuncatus*

Johnston, 1956, p. 259 ~ 1968, p. 173 • Kirby, 1910, p. 387 • Medler, 1980, p. 41

**Dist.:** ? Nigeria (Medler, 1980)

Hormis cette signalisation, l'espèce n'a été signalée que de la partie ouest du Cameroun (Mont Cameroun, Buea, Mont Etinde), et donc à proximité du Nigeria. Medler ne précise pas de localité pour ce dernier pays et sa signalisation doit être confirmée. Elle n'est pas à exclure même si les localités recensées du Cameroun sont situées à une certaine altitude (800 à 1500 m).

⊃ *Pterotiltus miniatulus* Karsch, 1893

*Pterotiltus miniatulus* Karsch, 1893, p. 108-109

Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 6 syntypes, 4 mâles et 2 femelles)

**Cit.:** *Pterotiltus miniatulus*

Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Dirsh, 1956c, p. 276, pl. 38 ~ 1965, p. 235, 236 • Hollis, 1975, p. 226-227 • Jago, 1967b, p. 241 ~ 1968, p. 246-247 • Karsch, 1893, p. 108-109 • Kirby, 1910, p. 387 • Johnston, 1956, p. 259-260 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 131 • Ramme, 1929, p. 312



**Dist.:** Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette espèce est également signalée de Guinée Équatoriale.

**PYCNODELLA** Descamps, 1965

Oedipodinae

*Pycnodella* Descamps, 1965, p. 1278-1279

Espèce-type : *Pycnodella pictula* Descamps, 1965, p. 1279

Genre afrotropical monospécifique.