

STAUROCLEIS Uvarov, 1923

Catantopinae

Staurocleis Uvarov, 1923c, p. 682

Espèce-type : *Staurocleis magnifica* Uvarov, 1923c, p. 682

Genre afrotropical monospécifique.

⊂ ***Staurocleis magnifica*** Uvarov, 1923

Staurocleis magnifica Uvarov, 1923c, p. 682-684

Holotype mâle, Ouganda, Entebbe, NHM Londres

Syn.: *Staurocleis magnifica occidentalis* Uvarov, 1923c, p. 684. Holotype mâle, Ghana, NHM Londres
[Dirsh, 1970, p. 262, avec *Staurocleis magnifica*]

Staurocleis occidentalis Sjöstedt, 1931a, p. 52-53 (nom. preoc). Syntypes mâles, femelle, Burkina Faso, NR Stockholm
[Dirsh, 1956a, p. 17, avec *Staurocleis magnifica occidentalis*]

Cit.: *Staurocleis magnifica*

COPR, 1982, p. 268-269 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Dirsh, 1956c, p. 275, pl. 34 ~ 1964, p. 59 ~ 1965, p. 346, 347 ~ 1970, p. 262-263 • Fishpool & Popov, 1984, p. 342 • Gillon, 1974b, p. 480-481 ~ 1983, p. 296 • Jago, 1984, p. 357-358 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 53 • Lecoq, 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 156-157 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Otte, 1995a, p. 339 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Popov, 1989, p. 52-53 • Roy, 2003, p. 343, 380, 387

Staurocleis magnifica occidentalis

Chapman, 1962, p. 29 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959a, p. 93 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965a, p. 953, 958 • Dirsh, 1956, p. 17 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Gillon, 1974a, p. 144 • Golding, 1948, p. 571 • Jago, 1967b, p. 260 ~ 1968, p. 268 • Johnston, 1956, p. 344 ~ 1968, p. 243 • Launois, 1978b, p. 154-155 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1980a, p. 59 ~ 1980b, p. 555-556 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 42 • Uvarov, 1923c, p. 684

Staurocleis occidentalis

Sjöstedt, 1931b, p. 52



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1956, 1964, 1965 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Gillon, 1974a,b • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1923c • *mat. exam.*) - Guinée (Roy, 2003) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1923c) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Gillon, 1983 • Jago, 1984 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce, à la coloration très caractéristique, est également signalée du Cameroun, du Zaïre et d'Ouganda. Elle est donc logiquement présente dans divers autres pays d'Afrique centrale (Centrafrique, Congo...).

STENOCROBYLUS Gerstäcker, 1869

Catantopinae

Stenocrobilus Gerstäcker, 1869, p. 219

Espèce-type : *Stenocrobilus cervinus* Gerstäcker, 1869, p. 220

Genre afrotropical comprenant une douzaine d'espèces.

⊂ ***Stenocrobilus cinnabarinus*** Ramme, 1929

Stenocrobilus cinnabarinus Ramme, 1929, p. 452, pl. 14 : f. 3

Holotype femelle, Centrafrique, Bosum, MNHU Berlin (DORSA : + 2 paratypes femelles)


Cit.: *Stenocrobylus cinnabarinus*

Descamps, 1965a, p. 953, 958-959 • Dirsh, 1965, p. 322, 323 • Jago, 1984, p. 366 • Johnston, 1956, p. 345 ~ 1968, p. 229 • Lecoq, 1980b, p. 555-556 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 57-58, 61 • Mestre, 1988, p. 138-139 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Otte, 1995a, p. 250 • Ramme, 1929, p. 452, pl. 14 • Roy, 1967, p. 1559-1560

? *Stenocrobylus* sp.

Jago, 1967b, p. 261 ~ 1968, p. 270

La description de cette espèce indéterminée, faite par Jago (1967b), espèce différente de *S. festivus* (citée aussi par cet auteur), est tout à fait conforme à *S. cinnabarinus* et nous y rapportons donc ces signalisations.



Dist.: Côte d'Ivoire (Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1967b, 1968) - Guinée (*mat. exam.*) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1967 • *mat. exam.*) - Togo (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - AO (Lecoq, 1980b)

Hormis notre zone, l'espèce n'est signalée que par la localité-type de Centrafrique.

U *Stenocrobylus festivus* Karsch, 1891

Stenocrobylus festivus Karsch, 1891, p. 190-191

Syntypes mâle(s), femelle(s), Cameroun, Barombi-Station et Kribi, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes Barombi-Stat.)

Syn.: *Stenocrobylus ornatus* Giglio-Tos, 1907b, p. 25. Syntypes mâles, femelles, Congo et Zaïre, MRSN Turin

[Uvarov, 1953b, p. 42, avec *Stenocrobylus festivus ornatus*]

[Dirsh, 1956a, p. 144, avec *Stenocrobylus festivus*]

Stenocrobylus festivus magnicercus Uvarov, 1953b, p. 43-44. Holotype mâle, Angola, NHM Londres

[Dirsh, 1956a, p. 144, avec *Stenocrobylus festivus*]

Cit.: *Stenocrobylus festivus*


Baccetti, 2004, p. 28 • I. Bolívar, 1893b, p. 176 • Chopard, 1958a, p. 138 • COPR, 1982, p. 267-268 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1963b, p. 214 ~ 1965, p. 322, 323 ~ 1970, p. 231-233 • Fishpool & Popov, 1984, p. 394 • Gillon, 1974a, p. 144 ~ 1974b, p. 479-480, 520-521, 528 • Golding, 1937, p. 9 ~ 1940b, p. 130 ~ 1946, p. 23, 34 ~ 1948, p. 571, 578-584 • Jago, 1968, p. 269-270 ~ 1984, p. 366 • Johnston, 1956, p. 346 ~ 1968, p. 229 • Karsch, 1893, p. 102 • Kirby, 1910, p. 485 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 555 • Le Gall, 1989 ~ 1991 ~ 1997 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 57-58, 61 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 138-139 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 328-329 ~ 1971, p. 71-97 • Ramme, 1929, p. 452, 453, 482, 484 • Roy, 2003, p. 341, 380, 387

Stenocrobylus festivus festivus

Chapman, 1962, p. 29 • Descamps, 1965a, p. 953, 960 • Dirsh, 1966, p. 217-218 • Jago, 1967b, p. 260 • Johnsen, 1970, p. 138, 140 • Johnston, 1956, p. 346 • Otte, 1995a, p. 251 • Uvarov, 1953b, p. 42-44

Stenocrobylus ornatus

Ramme, 1929, p. 449, 483



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001) - Côte d'Ivoire (Baccetti, 2004 • I. Bolívar, 1893b • COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall, 1989, 1991, 1997 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Liberia (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Mali (COPR, 1982 • Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1937, 1940b, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1953b) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Dirsh,

1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **Togo** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

L'aire de répartition s'étend vers l'est jusqu'à l'Éthiopie et, vers le sud, jusqu'à l'Angola et au Zimbabwe.

STENOHIPPIUS Uvarov, 1926

Gomphocerinae

Stenohippus Uvarov, 1926a, p. 423-425

Espèce-type : *Chorthippus (Stauroderus) xanthus* Karny, 1907, p. 363-364

Ce genre difficile a été révisé par Jago (1996a). Il est représenté de l'Afrique à l'Inde par neuf espèces dont six présentes en Afrique. Jago (1971, p. 226) avait mis ce genre en synonymie avec *Leva* l. Bolívar, 1909, mais ceci n'a pas généralement pas été suivi par la suite, et cet auteur est revenu sur cette synonymie dans son dernier travail.

Compte tenu de la grande confusion qui a régné dans ce genre, les déterminations antérieures à la révision de Jago sont très problématiques. Nous n'avons donc retenu pour la cartographie que les données de ce travail et le matériel que nous avons examiné.

⊔ *Stenohippus aequus* Uvarov, 1926

Stenohippus aequus Uvarov, 1926a, p. 426-427, pl. 47 : f. 8


Holotype mâle, Nord-Nigeria, Azare (*en fait Sherifuri, 40 km au nord*), NHM Londres

Cit.: *Leva aequa* (- us)

Johnsen, 1981a, p. 96 • Medler, 1980, p. 40

Stenohippus aequus

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 334-335 • Davey *et al.*, 1959b, p. 588-589 • Descamps, 1965b, p. 1292 • Dirsh, 1965, p. 533-534 • Fishpool & Popov, 1984, p. 378 • Golding, 1948, p. 537 • Jago, 1968, p. 340 ~ 1996a, p. 82, 84, 87, 115-116 • Johnston, 1956, p. 687 ~ 1968, p. 380 • Mestre, 1988, p. 276 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 326 • Uvarov, 1926a, p. 427



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Jago, 1996a) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Jago, 1996a) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1996a) - Niger (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1996a • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1926a) - Sénégal (Jago, 1996a) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)

Ne sont cartographiées que les localités issues de la révision de Jago et le matériel que nous avons examiné. Hors de notre zone d'étude, l'espèce n'est signalée que du Soudan.

⊔ *Stenohippus mundus* (Walker, 1871)

Stenobothrus mundus Walker, 1871, p. 79-80

Holotype femelle (*indiqué mâle par Walker*), Inde, Bombay, NHM Londres

Syn.: *Stenobothrus epacromioides* Walker, 1871, p. 81. Holotype femelle, Inde, NHM Londres

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]

Stenobothrus epacromioides Krauss, 1877, p. 144, nom. praeoc. Holotype femelle, Sénégal, NM Vienne

[l. Bolívar, 1918b, p. 380, avec *Stauroderus bonneti*, nom. subst.]

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]

Stenobothrus bonneti l. Bolívar, 1885, p. 116. Syntypes mâle(s), femelle(s) (holotype mâle, Jago, 1996a), Tunisie, MNHN Paris

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]

Stenobothrus epacromioides var. *nigrovittata* Krauss, 1892, p. 166. Lectotype mâle (Jago, 1996a), Îles Canaries, NM Vienne

[l. Bolívar, 1918b, p. 380, avec *Stauroderus bonneti*]

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]

Stenobothrus bonneti orientalis Uvarov, 1933b, p. 666-667. Holotype mâle, Israël, NHM Londres

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]