

*Stobbea togoensis*

Descamps, 1965a, p. 948, 950 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277, 280-281 • Dirsh, 1965, p. 254 • Jago, 1964a, p. 193 ~ 1967b, p. 261 ~ 1968, p. 291 • Johnston, 1956, p. 461 ~ 1968, p. 190 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 548, 550 • Mestre, 1988, p. 114-115 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Mestre *et al.*, 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 162 • Ramme, 1929, p. 464-466, pl. XV • Roy, 1969a, p. 212



**Dist.:** ? Bénin (Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - ? Togo (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b)

Ce sont les seules signalisations de cette espèce. Nous y rapportons sous toute réserve le matériel examiné du Bénin. La citation du Togo, issue de Dirsh (1965), se réfère probablement au type du Ghana (localité incluse autrefois dans le Togoland).

⊃ *Stobbea sp.*

**Cit.:** *Stobbea sp.*

Davey *et al.*, 1959a, p. 108 • Johnston, 1968, p. 190

**Dist.:** Mali (Davey *et al.*, 1959a)

**SUDANACRIS** Uvarov, 1944

Tropidopolinae

*Sudanacris* Uvarov, 1944, p. 15 (clé), 18

Espèce-type : *Opsomala pallida* Burmeister, 1838, p. 611

Genre afrotropical, revu par Grunshaw (1996), comprenant quatre espèces.

⊃ *Sudanacris pallida* (Burmeister, 1838)

*Opsomala pallida* Burmeister, 1838, p. 611

Type Sénégal, perdu selon Grunshaw (1996, p. 154, 155) (DORSA : non recensé)

**Cit.:** *Ischnacrida pallida*

Chopard, 1943c, p. 394-395 • Karny, 1907, p. 298, 299 • Kirby, 1910, p. 405 • Krauss, 1878, p. 45-46 • Ramme, 1929, p. 339, 340

*Ischnacrida sp. n.* (= *S. pallida* selon Golding, 1948, p. 526)

Golding, 1934a, p. 278-282, 291

*Leptacris pallida*

Mallamaire, 1948, p. 632 • Uvarov, 1926a, p. 444

*Opomala pallida*

Walker, 1870a, p. 510


*Opsomala pallida*

Burmeister, 1838, p. 611

*Sudanacris pallida*

Boisson, 1961, p. 28 • Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959a, p. 109 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965b, p. 1308 ~ 1968, p. 543 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 109 • Dirsh, 1956c, p. 279, pl. 50 ~ 1965, p. 210, 211 • Fishpool & Popov, 1984, p. 388 • Golding, 1948, p. 557-558, 578-584 • Grunshaw, 1996, p. 152, 153, 154-155 • Johnston, 1956, p. 230 ~ 1968, p. 155 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 541, 543 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 74-75 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 87 • Roy, 1971, p. 404 • Uvarov, 1944, p. 18

**Dist.:** "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - Mali (Boisson, 1961 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Grunshaw, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mauritanie (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1934a, 1948 • Grunshaw, 1996 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1926a) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Grunshaw, 1996 • Karny, 1907 • Krauss, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - "Sénégalie" (Burmeister, 1838 • Chopard, 1943c • Walker, 1870a) - Tchad (Chopard, 1943c • Descamps, 1968 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1965 • Lecoq, 1978b, 1980b • Mallamaire, 1948)



La signalisation de Gambie (Mestre & Chiffaud, 1997) est une erreur. L'espèce est également signalée du Soudan.

**SUMBA** I. Bolívar, 1909

Acridinae

*Sumba* I. Bolívar, 1909b, p. 288-289

Espèce-type : *Sumba roseipennis* I. Bolívar, 1912b (1911), p. 78

Genre afrotropical comprenant six espèces.

⊃ ***Sumba longicornis*** Ramme, 1929

*Sumba longicornis* Ramme, 1929, p. 275, pl. 3 : f. 25-26

Holotype mâle, Centrafrique, Bosum, MNHU Berlin (DORSA : + 11 paratypes)

Cit.: *Sumba longicornis*

Dirsh, 1965, p. 422, 423 • Fishpool & Popov, 1984, p. 400 • Johnston, 1956, p. 616 • Jago, 1968, p. 314-315 • Johnsen, 1971, p. 40-42 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 305 • Ramme, 1929, p. 257

*Sumba* sp. (identification sous réserve de la bonne affectation générique, *S. longicornis* étant la seule espèce ouest-africaine)  
Delarze & Le Gall, 1989, p. 279, 280



Dist.: ? Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Cette espèce est aussi signalée de Centrafrique.

**TAIACRIS** Donskoff, 1986

Catantopinae

*Taiacris* Donskoff, 1986, p. 206-207

Espèce-type : *Taiacris couturieri* Donskoff, 1986, p. 207-209

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ ***Taiacris couturieri*** Donskoff, 1986

*Taiacris couturieri* Donskoff, 1986, p. 207-209, fig. 17-33

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Forêt de Taï, MNHN Paris

Cit.: *Taiacris couturieri*

Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Donskoff, 1986, p. 207-209, fig. 17-33 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118

Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Donskoff, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997)