

Nigeria (I. Bolívar, 1904c • COPR, 1982 • Comes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1940b, 1948 • Jago, 1968 • Kevan, 1975 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saussure, 1899) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Togo** (Jago, 1968 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette sous-espèce est également signalée du Cameroun, de Centrafrique, du Zaïre, d'Ouganda et du nord de la Tanzanie.

⊃ ***Taphronota merceti*** I. Bolívar, 1904

Taphronota merceti I. Bolívar, 1904, p. 398

Holotype mâle, Congo Belge (= Zaïre), Stanley Pool, MNCN Madrid (Kevan, 1975) (indiqué à tort perdu : Dirsh, 1970)

Syn.: *Pyrgophyma splendens* Giglio-Tos, 1907b, p. 3. Lectotype femelle (Kevan, 1963b), Congo, MRSN Turin [Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 216, avec *Taphronota (Taphronota) merceti*]
Taphronota corallipes Sjöstedt, 1929a, p. 14, 40. Lectotype femelle (Kevan, 1963b), Congo, NR Stockholm [Kevan, 1956, p. 972, avec *Taphronota splendens*] [Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 216, avec *Taphronota (Taphronota) merceti*]
Taphronota nigripes Sjöstedt, 1929a, p. 14-15, 40. Holotype femelle, Congo, NR Stockholm [Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 216, avec *Taphronota (Taphronota) merceti*]

Cit.: *Taphronota merceti*
 Dirsh, 1965, p. 117, 118 • Kirby, 1910, p. 309 • Mestre, 1988, p. 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115
Taphronota (Taphronota) merceti
 Kevan, 1975, p. 86, 105-108, 137, 138, 145 - 1977, p. 302-303 • Otte, 1994b, p. 140 • Roy, 2003, p. 318, 379, 385
Taphronota splendens
 Johnston, 1956, p. 90 (citation erronée de la Guinée attribuée à Kevan, 1963b, p. 109)
Taphronota sp. (= *Taphronota merceti* selon Kevan, 1975, p. 105, 108)
 Dirsh, 1963b, p. 208



Dist.: Guinée (Dirsh, 1963b • Kevan, 1975 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003)

L'espèce est également signalée du Cameroun, Zaïre et Nord-Angola.

⊃ ***Taphronota occidentalis*** Karsch, 1892 (?, présence à confirmer)

Taphronota calliparea var. *occidentalis* Karsch, 1892, p. 70

Syntypes mâle (?), femelles, Cameroun, MNHU Berlin. Lectotype mâle (Kevan (1975) (DORSA : + 1 paralectotype)

Syn.: *Taphronota rostrata* Saussure, 1899, p. 644, 645. Lectotype mâle (Kevan, 1975), Cameroun, MHN Genève. [Kevan & Roy, p. 263, avec *Taphronota occidentalis*]

Cit.: *Taphronota occidentalis*
 Jago, 1968, p. 223 (partie selon Kevan, 1975) • Kirby, 1910, p. 310 • Medler, 1980, p. 37

Dist.: Nigeria (Jago, 1968 • Medler, 1980)

Kevan (1975) ne cite *T. occidentalis* que du Cameroun, notamment près de la frontière nigériane. Les signalisations du Nigeria (sans précision de localité), à confirmer, seraient donc a priori possibles dans cette région frontalière.

TENUITARSUS I. Bolívar, 1904

Pyrgomorphae

Tenuitarsus I. Bolívar, 1904a, p. 90

Espèce-type : *Tenuitarsus revoili* I. Bolívar, 1904a, p. 90-91 [= *T. angustus*]

Ce genre englobe selon Kevan (1977) trois petites espèces xérophiles et terricoles, deux d'entre elles étant présentes dans les régions sahéliennes et sub-désertiques d'Afrique de l'Ouest. Leur séparation spécifique n'est pas évidente, si tant qu'elle soit fondée, et leur répartition respective mérite d'être vérifiée.


⊃ ***Tenuitarsus angustus*** (Blanchard, 1836)

Ommexecha angustum Blanchard, 1836, p. 624

Iconotype femelle, illustration dans Savigny (1826), *Description de l'Égypte*, atlas 10, pl. 6 : f. 1. Néotype femelle, Égypte, près du Caire, UMNH Oxford, désigné par Kevan (1953a, p. 41)

Syn.: *Ommexecha linearis* Burmeister, 1838, p. 657. Type Égypte, illust. Savigny, 1826, pl. 6
 [Uvarov, 1924a, p. 36, avec *Tenuitarsus angustus*]
Leptoscirtus savignyi Saussure, 1889, p. 89-90. Type femelle, illust. Savigny, 1826, pl. 6 : f. 1, Égypte (= iconotype de *T. angustus*)
 [Uvarov, 1924a, p. 36, avec *Tenuitarsus angustus*]
Tenuitarsus revoili I. Bolívar, 1904a, p. 90-91. Type femelle (holotype selon Kevan, 1953a), Somalie, MNHN Paris
 [Uvarov, 1924a, p. 36, avec *Tenuitarsus angustus*]
Leptoscirtus evansi Uvarov, 1921d, p. 63-64. Holotype mâle, Irak, NHM Londres
 [Kevan, 1953a, p. 43, avec *Tenuitarsus angustus*]

Cit.: *Leptoscirtus angustus*
 Kirby, 1910, p. 269
Tenuitarsus angustus
 Chopard, 1952, p. 468 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 28, 206 • Descamps, 1968, p. 539, 540 • Dirsh, 1965, p. 110-111
 • Johnston, 1956, p. 109-110 ~ 1968, p. 69 • Kevan, 1953a, p. 43-48 ~ 1959, p. 181, 185-189 ~ 1977, p. 530-532 • Launois, 1978b, p. 72-73 • Lecoq, 1980b, p. 535 • Mestre, 1988, p. 48-49 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994b, p. 54




Dist.: **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Kevan, 1953a, 1959 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Kevan, 1959 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Kevan, 1977 • Launois, 1978b • Lecoq, 1980b)

Cette espèce est citée également d'Afrique du Nord et du Nord-Est, s'étendant via l'Arabie jusqu'au Baloutchistan.

U *Tenuitarsus sudanicus* Kevan, 1953

Tenuitarsus sudanicus Kevan, 1953a, p. 45, 48-53, fig. 2, 2a, 3a, 3b, 4a, 5, 6a, 6b, 7a-d
 Holotype mâle, Soudan, Es Sidr, NHM Londres

Cit.: *Tenuitarsus sudanicus*
 Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • Descamps, 1968, p. 539, 540 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 109 • Dirsh, 1965, p. 111 • Fishpool & Popov, 1984, p. 325 • Johnston, 1956, p. 110 ~ 1968, p. 69 • Kevan, 1953a, p. 45, 48-53 ~ 1959, p. 181-183, 188 ~ 1977, p. 532-533 • Launois, 1978b, p. 74-75 • Launois-Luong, 1980b, p. 774-814 • Lecoq, 1980b, p. 535 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 48-49 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994b, p. 55 • Popov, 1989, p. 20-21
Tenuitarsus sp. (= *Tenuitarsus sudanicus* selon Kevan, 1953a, 1959)
 Golding, 1948, p. 547



Dist.: **Mali** (Fishpool & Popov, 1984 • Kevan, 1959 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Launois-Luong, 1980b • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Dirsh, 1965 • Kevan, 1959, 1977 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Kevan, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Kevan, 1953, 1959 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **AO** (Kevan, 1977 • Launois, 1978b • Lecoq, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce terricole est très commune au Niger dans les bandes nord-soudanienne et sahélienne. Elle affectionne les milieux ouverts au sol sableux, notamment les champs de mil, mais n'a été pourtant que tardivement décrite. Curieusement, elle n'a pas été signalée des zones équivalentes du Mali hormis par Fishpool & Popov (1984) pour la partie ouest. Cette espèce est également citée du Soudan.

THAMITHERICLES Descamps, 1977

Thericleinae


Thamithericles Descamps, 1977, p. 121-124
Espèce-type : *Thericles quagga* Karsh, 1893, p. 116

Genre afrotropical comprenant une douzaine d'espèces aptères.

⊃ ***Thamithericles quagga*** (Karsch, 1893)

Thericles quagga Karsch, 1893, p. 116
Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckburg. Holotype mâle, NR Stockholm, et allolectotype, MNHU Berlin, désignés par Descamps (1977, p. 129) (DORSA : paralectotype = allolectotype femelle, MNHU)

Cit.: *Thamithericles quagga*
Descamps, 1973b, p. 234 ~ 1977, p. 129, 130 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 93
Thericles quagga
Dirsh, 1965, p. 27 • Jago, 1967b, p. 241 ~ 1968, p. 217 • Johnston, 1956, p. 15 ~ 1968, p. 35 • Karsch, 1893, p. 116 • Kirby, 1910, p. 81



Dist.: **Togo** (Descamps, 1977 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997)
Jago (1967b, 1968) signale la présence au Ghana comme probable sans cependant l'attester. En dehors de la série-type du Togo, cette espèce est signalée de Centrafrique et du Congo.

TMETONOTA Saussure, 1884

Oedipodinae

Tmetonota Saussure, 1884, p. 56 (clé), 159
Espèce-type : *Trilophidia rugosa* Stål, 1873b, p. 132 [Kirby, 1910, p. 245]

Genre afrotropical comprenant sept espèces, principalement d'Afrique australe.

⊃ ***Tmetonota peregrina*** Karny, 1915

Tmetonota peregrina Karny, 1915, p. 136-137
Holotype femelle, Guinée Française, NM Vienne

