

1968, p. 365 • Launois-Luong, 1980b, p. 774-814 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 69 ~ 1980b, p. 578-579 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 248-249 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Otte, 1995b, p. 311 • Popov, 1989, p. 148-149 • Roy, 1964c, p. 123 ~ 1967, p. 1564 ~ 1971, p. 408

**Dist.:** **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1951a, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - **Niger** (Chopard, 1952 • Dirsh, 1951a, 1965 • Launois-Luong, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Medler, 1980) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1967) - "**Soudan**" (Chopard, 1952) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Dirsh, 1951a, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Lecoq, 1980b • Popov, 1989 • Roy, 1964c)

Cette espèce est signalée vers l'est jusqu'en Somalie et, au-delà, jusqu'au sud-ouest asiatique.

#### U *Truxalis* sp.

**Cit.:** *Acridella* spp.

Descamps, 1953, p. 604 • Golding, 1934, p. 285 ~ 1948, p. 528

*Truxalis* spp.

Davey, 1959, p. 127

*Truxalis* species ?

Johnston, 1968, p. 365

**Dist.:** **Mali** (Davey, 1959) - **Nigeria** (Golding, 1934, 1948) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953)

## TRUXALOIDES Dirsh, 1951

Acridinae

*Truxaloides* Dirsh, 1951a, p. 135 (clé), 223-224

Espèce-type : *Truxalis serratus* Thunberg, 1815, p. 269

Genre afrotropical comprenant près d'une dizaine d'espèces dont trois en Afrique de l'Ouest : *T. chekei*, *T. braziliensis* et *T. serratus*. *T. braziliensis* a été scindé en deux sous-espèces : *T. b. braziliensis* et *T. b. eos*. Leur validité devra être vérifiée car les critères distinctifs sont peu significatifs et, là encore, leur répartition géographique paraît en grande partie chevauchante.

D'après la révision de Dirsh (1951a), *T. braziliensis braziliensis* ne serait présente qu'en Afrique orientale et centrale, alors qu'en Afrique occidentale, il s'agirait de la sous-espèce *T. braziliensis eos*, à laquelle doivent donc être rapportées toutes les signalisations. Cependant, ce même auteur (1966, p. 460 et 1970, p. 532) cite la sous-espèce nominative de plusieurs pays de notre zone d'étude. Nous avons regroupé sous l'appellation *T. braziliensis ssp.* les signalisations sans précision subsppécifique.

Certaines des signalisations résultant d'identifications initiales incertaines suivies de mises en synonymies ultérieures des taxons concernés, il n'est pas exclu qu'elles puissent également se rapporter à des espèces du genre *Truxalis*, très ressemblant.

#### U *Truxaloides braziliensis braziliensis* (Drury, 1773) (présence à confirmer)

*Gryllus Acrida braziliensis* Drury, 1773, p. 76, pl. 40 : f. 1

Type "Brazil, Rio de Janeiro" (erreur de localité), perdu

**Syn.:** *Truxalis erythropterus* Latreille, 1804, p. 148. Sans précision, appellation différente pour *T. braziliensis*

[Dirsh, 1951a, p. 237, avec *Truxaloides braziliensis braziliensis*]

*Acrida rendalli* Kirby, 1902a, p. 62-63. Type femelle (holotype selon Dirsh, 1951), Afrique du Sud, NHM Londres

[Dirsh, 1951a, p. 237, avec *Truxaloides braziliensis braziliensis*]

*Acrida aspersata* Kirby, 1902a, p. 63. Holotype femelle, Afrique de l'Est, NHM Londres

[Dirsh, 1951a, p. 237, avec *Truxaloides braziliensis braziliensis*]

*Acridella sheffieldi* I. Bolívar, 1912b, p. 75. Type femelle, Zaïre, MRAC Tervuren

[Dirsh, 1951a, p. 237, avec *Truxaloides braziliensis braziliensis*]

*Acridella stigmatica* I. Bolívar, 1912b, p. 75. Type mâle, Zaïre, MRAC Tervuren

[Dirsh, 1951a, p. 237, avec *Truxaloides braziliensis braziliensis*]

*Acridella rothschildi* I. Bolívar, 1919, p. 242-243. Type femelle, Éthiopie, MNHN Paris

[Dirsh, 1951a, p. 237, avec *Truxaloides braziliensis braziliensis*]

**Cit.:** *Acrida rendalli*

Mallamaire, 1948, p. 631 • Risbec, 1950a, p. 42 ~ 1950b, p. 317

*Acridella rendalli*

Uvarov, 1938a, p. 152

*Truxalis braziliensis braziliensis*

Dirsh, 1966, p. 459-460 ~ 1970, p. 531-532

*Truxaloides braziliensis braziliensis*

Johnston, 1956, p. 738 ~ 1968, p. 365 • Lecoq, 1980b, p. 578-579 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 124 •

Otte, 1995b, p. 312

**Dist.:** **Bénin** (Dirsh, 1966, 1970) - **Burkina Faso** (Dirsh, 1966, 1970) - "**Soudan Français**" (Risbec, 1950a,b) - **Nigeria** (Dirsh, 1966, 1970 • Medler, 1980 • Uvarov, 1938a) - **Sénégal** (Dirsh, 1966, 1970 • Risbec, 1950a,b) - **AO** (Lecoq, 1980b • Mallamaire, 1948)

Voir remarques introductives ci-avant quant à la présence ou non de cette sous-espèce. Aucune localité précise n'est fournie dans les publications citées. La citation du Nord-Nigeria d'Uvarov (1938a) correspond très probablement au matériel identifié par Dirsh (1951a) comme *T. b. eos* (localité Azare).

⊃ ***Truxaloides braziliensis eos*** Dirsh, 1951


*Truxaloides braziliensis eos* Dirsh, 1951a, p. 224 (clé), 243, 245, carte 10 (p. 241)

Holotype femelle, Nord-Nigeria, Azare, NHM Londres

**Cit.:** *Truxaloides braziliensis eos*

Davey *et al.*, 1959b, p. 596 • Descamps, 1965b, p. 1293 • Dirsh, 1951a, p. 243, 245 • Johnston, 1956, p. 739 ~ 1968, p. 365  
• Lecoq, 1980b, p. 578-579 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 313 • Phipps, 1962, p. 13-21

**Dist.:** Bénin (Dirsh, 1951a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Burkina Faso (Dirsh, 1951a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Dirsh, 1951a • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Dirsh, 1951a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (Phipps, 1962 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1980b)



⊃ ***Truxaloides braziliensis ssp.***

**Cit.:** *Truxaloides brasiliensis*

COPR, 1982, p. 561-562 • Phipps, 1970, p. 343

*Truxaloides braziliensis*

Dirsh, 1965, p. 508 • Kirby, 1910, p. 96 • Mestre, 1988, p. 246-247 • Roy, 1964c, p. 124

**Dist.:** Bénin (COPR, 1982 • Dirsh, 1965, p. 508 • Mestre, 1988) - Burkina Faso (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Mestre, 1988) - Liberia (Roy, 1964c) - Mali (Mestre, 1988) - Nigeria (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Mestre, 1988) - Sénégal (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Mestre, 1988 • Roy, 1964c) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Phipps, 1970) - AO (COPR, 1982)

Les signalisations de Sierra Leone dues à Phipps sont rapportées à *T. b. eos* en 1962 et sans précision subsppécifique en 1970.


⊃ ***Truxaloides chekei*** Popov, 1985

*Truxaloides chekei* Popov, 1985a, p. 201-204, fig. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Holotype mâle, Togo, Mt Djamdé, chaîne de Piha, forêt classée de Djamdé, 15 km W. of Lama-Kara, NHM Londres

**Cit.:** *Truxaloides chekei*

Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279-281 • Mestre, 1988, p. 292 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Otte, 1995b, p. 313 • Popov, 1985a, p. 201-205



**Dist.:** Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov, 1985a)

A sa description, l'espèce n'était connue que par des spécimens mâles. La femelle a été décrite par Delarze & Le Gall (1989). Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊃ ***Truxaloides serratus*** (Thunberg, 1815) (? , présence douteuse)

*Truxalis serratus* Thunberg, 1815, p. 269

Type femelle, ZI Uppsala

**Cit.:** *Acrida serrata*

Burr, 1902, p. 176-177 • Kirby, 1910, p. 97

*Truxalooides serratus*

Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 60 • Johnston, 1956, p. 739-740 ~ 1968, p. 366 • Otte, 1995b, p. 313 • Roy, 1964c, p. 124

**Dist.:** Sierra Leone (Burr, 1902 • Roy, 1964c)

Cette espèce, connue d'Angola et de plusieurs pays d'Afrique australe, n'est pas signalée en Afrique de l'Ouest par Dirsh (1951a) dans sa révision du genre et sa présence est douteuse. La description fournie par Burr, conforme à celle de *T. serratus*, ne permet pas de rapporter sa signalisation de Sierra Leone, si elle est exacte, à *T. braziliensis* ou *T. chekei*.

En effet, la couleur typique des ailes de *T. serratus* (partie basale hyaline à légèrement jaunâtre ou verdâtre, apex enfumé) est très différente de celle de ces deux autres espèces (base des ailes nettement colorée et apex non enfumé). Mais cela pourrait correspondre à un imago de *T. braziliensis* venant de muer avec les ailes encore peu pigmentées. Notons en effet que Phipps (1970) cite *T. braziliensis*, si l'identification est correcte, de la même région de collecte.

## TUAREGA Uvarov, 1943

Akicerinae

*Tuarega* Uvarov, 1943g, p. 3, 4, 8, 14, 31, 36, 47

Espèce-type : *Oedipoda insignis* Lucas, 1851, p. 370-373

Syn.: *Eremocharis* Saussure, 1884, p. 63, 233-234 (partim) [Uvarov, 1943g, p. 47, avec *Tuarega*]

Genre monospécifique saharien.

### ⊂ *Tuarega insignis* (Lucas, 1851)

*Oedipoda insignis* Lucas, 1851, p. 370-373

Type femelle, Algérie, Kefoum-Teboul, MNHN Paris

**Syn.:** *Eremobia jaminii* Lucas, 1853, lxx. Type femelle, Algérie, dépositaire ? MNHN Paris

[Lucas, 1857, p. cvi, avec *Eremobia (Oedipoda) insignis*]


*Batrachotettix elephas* Saussure, 1884, p. 236, 237. Type femelle, "Afrique du Sud" (err. d'après Saussure, 1888a), NM Vienne [Saussure, 1888a, p. 135-136, avec *Eremocharis insignis*]

**Cit.:** *Eremocharis insignis*

Chopard, 1932, p. 870 ~ 1936a, p. 72 ~ 1943c, p. 334 • Kirby, 1910, p. 290

*Tuarega insignis*

Chopard, 1952, p. 472 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 127, 185, 203 • Descamps, 1968, p. 539 • Dirsh, 1956c, p. 272, pl. 17 ~ 1965, p. 86-87 • Johnston, 1956, p. 64-65 ~ 1968, p. 62 • Mestre, 1988, p. 42-43 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Morales Agacino, 1945, p. 330 ~ 1948, p. 16 • Otte, 1994b, p. 163 • Roy, 1960, p. 199



**Dist.:** Mauritanie (Chopard, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "Rio de Oro" (Chopard, 1943c • Morales Agacino, 1945, 1948) - Tchad (Chopard, 1932, 1936a, 1943c • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Roy, 1960)

Espèce du domaine désertique saharien, signalée depuis l'ancien Sahara espagnol jusqu'à l'Égypte.

## TYLOTROPIDIUS Stål, 1873

Eyprepocnemidinae

*Pezotettix (Tylostropidius) Stål*, 1873b, p. 74

Espèce-type : *Gryllus didymus* Thunberg, 1815, p. 241