

exam.) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Nigeria (Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - ? Sénégal (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Phipps, 1971) - Sierra Leone (Dirsh, 1966, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • *mat. exam.*) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)



Les signalisations du Sénégal, non originales, reprennent vraisemblablement Roy (1962), signalisation qui est en fait à rapporter à *A. verticula* (voir ci-dessous). L'espèce est également citée d'Angola et du Zaïre.

⊔ *Azarea verticula* Jago, 1966


Azarea verticula Jago, 1966b, p. 364-368, fig. 56-61

Holotype mâle, Ghana, Northern region, 4 miles N. of Mole River, Busunu-Doboye road, NHM Londres

Cit.: *Azarea llyodi* (Err. dét. pour *Azarea verticula* d'après Roy, 1969a, p. 198)
Roy, 1962, p. 134

Azarea verticula

Fishpool & Popov, 1984, p. 406 • Jago, 1966b, p. 364-368 ~ 1967b, p. 252 ~ 1968, p. 343 • Johnston, 1968, p. 368 • Lecoq, 1980b, p. 580, 582 • Mestre, 1988, p. 254-255 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 109 • Roy, 1969a, p. 219



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1966b, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a • *mat. exam.*) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1980b)

L'espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

BADISTICA Karsch, 1891

Oxyinae

Badistica Karsch, 1891, p. 194

Espèce-type : *Badistica bellula* Karsch, 1891, p. 195

Ce genre d'espèces microptères forestières, n'inclut que des espèces présentes à l'ouest du Nigeria, hormis *B. bellula* citée de la partie occidentale du Cameroun. Aucune espèce n'a été jusqu'ici signalée du Nigeria.


⊔ *Badistica bellula* Karsch, 1891 (? , présence à confirmer)

Badistica bellula Karsch, 1891, p. 195, 2 fig.

Syntypes mâles, femelles, Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : 14 syntypes, 6 mâles et 8 femelles)

Cit.: *Badistica bellula*

Dirsh, 1956c, p. 276, pl. 38 ~ 1965, p. 231-232 • Hollis, 1975, p. 214, 220 • Johnsen, 1971, p. 21-23, 26 • Johnston, 1956, p. 255 ~ 1968, p. 170 • Kirby, 1910, p. 396 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 128 • Phipps, 1962, p. 13-21 • Ramme, 1929, p. 484



Dist.: ? Sierra Leone (Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962) - AO (Johnsen, 1971)

La citation de Phipps (1962) est très douteuse car *B. bellula*, type du genre et unique représentant du genre hors de notre zone d'étude, n'est citée que du Cameroun, vers la frontière avec le Nigeria. D'autant plus, qu'en 1970 (p. 325), ce même auteur cite par erreur deux fois de suite *B. simpsoni*. D'après les localités et les dates de collecte, la deuxième citation semble se rapporter à ce qu'il avait appelé *B. bellula* en 1962, et qu'il ne cite pas dans cet article. Mais il pourrait s'agir également de *B. fascipes* (ci-dessous), très ressemblante.

⊔ ***Badistica fascipes*** Chopard, 1958

Badistica fascipes Chopard, 1958a, p. 128, fig. 1


Holotype femelle, Guinée, Nion (Monts Nimba), MNHN Paris

Cit.: *Badistica fascipes*

Chopard, 1958a, p. 128-129 • Dirsh, 1965, p. 231-232 • Hollis, 1975, p. 214, 220 • Jago, 1966a, p. 334-336 ~ 1968, p. 244 • Johnsen, 1971, p. 22-23, 26 • Johnston, 1968, p. 170 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 128 • Roy, 2003, p. 331, 379, 386

Badistica lauta (Err. dét. pour *Badistica fascipes* selon Jago, 1966a, p. 335)

Dirsh, 1963b, p. 210



Dist.: Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Jago, 1966a, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Liberia (Jago, 1966a, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre & Chiffaud, 1997)


⊔ ***Badistica lauta*** Karsch, 1896

Badistica lauta Karsch, 1896, p. 282, fig. 16-16a

Syntypes mâle(s), femelle(s), Togo, Misahöhe, MNHU Berlin. Lectotype mâle, MNHU Berlin, désigné par Jago (1966a, p. 340) (DORSA : + 5 paralectotypes, 3 femelles et 2 mâles).

Cit.: *Badistica lauta*

Chapman, 1962, p. 21 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • 1965, p. 232 • Dirsh, 1965, p. 231-232 • Gillon, 1974a, p. 137 ~ 1974b, p. 469, 526 • Hollis, 1975, p. 214, 220 • Jago, 1966a, p. 336-340 ~ 1967b, p. 238-239, 244, 245 ~ 1968, p. 243-244 • Johnsen, 1971, p. 26 • Johnston, 1956, p. 255 ~ 1968, p. 171 • Karsch, 1896, p. 282 • Kirby, 1910, p. 396 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48, 60 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 128 • Phipps, 1970, p. 325



Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1966a, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1966a, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Liberia (Jago, 1966a, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (Mestre & Chiffaud,

1997 • Phipps, 1970) - **Togo** (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Jago, 1966a, 1968 • Karsch, 1896 • Kirby, 1910 • Mestre & Chiffaud, 1997)


Selon Jago (1966a, p. 335), la signalisation de Guinée (Nimba) due à Dirsh (1963b, p. 210) est une erreur de détermination pour *B. fascipes*, que Dirsh avait considéré comme synonyme. D'après ce même Jago, *B. lauta* s'étendrait du Togo à l'est du Liberia, remplacée plus à l'ouest par *B. fascipes*. Dans ce cas, la signalisation de Phipps (1970) en Sierra Leone serait donc une erreur.

⊔ *Badistica margarita* Jago, 1966

Badistica margarita Jago, 1966a, p. 331-334, fig. 1A, 1B, 2A
Holotype mâle, Ghana, Princes Town, Western Region, NHM Londres

Cit.: *Badistica margarita*

Hollis, 1975, p. 214, 220 • Jago, 1966a, p. 331-334 ~ 1967b, p. 244-245 ~ 1968, p. 244-245 • Johnsen, 1971, p. 26 • Johnston, 1968, p. 171 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 128



Dist.: **Ghana** (Hollis, 1975 • Jago, 1966a, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997)


Cette espèce n'est pour l'instant signalée que de la localité type.

⊔ *Badistica ornata* I. Bolívar, 1905

Badistica ornata I. Bolívar, 1905b, p. 229-230
Syntypes mâle(s), femelle(s), Ashanti (≡ *Ghana*). Holotype mâle (Hollis, 1975), MNHU Berlin (DORSA : 1 syntype)

Cit.: *Badistica ornata*

I. Bolívar, 1905b, p. 229 • Chapman, 1961, p. 267, 273 ~ 1962, p. 21-22, 60 • Chopard, 1958a, p. 128 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1965, p. 231-232 • Gillon, 1974a, p. 137 ~ 1974b, p. 469, 526 • Hollis, 1975, p. 214, 220 • Jago, 1967b, p. 245 ~ 1968, p. 242-243 • Johnsen, 1971, p. 22-26 • Johnston, 1956, p. 255 ~ 1968, p. 171 • Kirby, 1910, p. 396 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48, 57-58, 60 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 128 • Ramme, 1929, p. 335-336, 483 • Roy, 2003, p. 330, 379, 386



Dist.: **Côte d'Ivoire** (Chopard, 1958a • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (I. Bolívar, 1905b • Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Jago, 1967b, 1968 • Johnsen, 1971 • Kirby, 1910 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Liberia** (Johnsen, 1971 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

⊔ *Badistica simpsoni* Ramme, 1929


Badistica simpsoni Ramme, 1929, p. 336-337, fig. 52a, 52b
Holotype mâle, Sierra Leone, Jahama, NHM Londres

Cit.: *Badistica simpsoni*

Chopard, 1958a, p. 128 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1963b, p. 210 ~ 1965, p. 231-232 • Hollis, 1975, p. 214, 220 • Johnsen, 1971, p. 24-26 • Johnston, 1956, p. 256 ~ 1968, p. 171 • Lamotte & Roy, 1998, p. 100 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 128-129 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 325 • Ramme, 1929, p. 336-337 • Roy, 2003, p. 330-331, 379, 386

Dist.: **Côte d'Ivoire** (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Johnsen, 1971 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Liberia** (Johnsen, 1971

- Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Ramme, 1929)



BAIDOCERACRIS Chopard, 1947

Gomphocerinae

Baidoceracris Chopard, 1947, p. 152

Espèce-type : *Baidoceracris zolotarewskyi* Chopard, 1947, p. 152

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ *Baidoceracris zolotarewskyi* Chopard, 1947

Baidoceracris zolotarewskyi Chopard, 1947, p. 152

Holotype mâle, Mali, Dia-Diafarabé, MNHN Paris

Cit.: *Baidoceracris zolotarewskyi*

Chapman, 1962, p. 55 • Chopard, 1947, p. 152 • Davey *et al.*, 1959b, p. 591-592 • Descamps, 1965b, p. 1292 • Dirsh, 1958c, p. 62-63 ~ 1965, p. 512-513 • Fishpool & Popov, 1984, p. 406 • Jago, 1967b, p. 250 ~ 1968, p. 342 • Johnston, 1956, p. 720 ~ 1968, p. 368 • Lecoq, 1978b, 243 ~ 1980b, p. 580, 582 • Mestre, 1988, p. 258-259 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 109



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "**French Sudan**" (Dirsh, 1965) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Mali** (Chopard, 1947 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone.

BERENGUERIA I. Bolívar, 1909

Gomphocerinae

Berengueria I. Bolívar, 1909b, p. 296

Espèce-type : *Berengueria rotundifrons* I. Bolívar, 1912b, p. 83 [Uvarov, 1953b, p. 176]

Ce genre afrotropical, qui avait été mis en synonymie avec *Dnopherula* par Dirsh (1958a), a été réhabilité par Jago (1996) qui y inclut trois espèces.

Cet auteur a par ailleurs décrit comme espèce nouvelle *B. cryptica*, très voisine de *B. bifoveolata*, avec qui elle coexiste fréquemment et avait été jusqu'ici confondue. La répartition respective de ces deux espèces devra donc être revue.

⊃ *Berengueria bifoveolata* (Karsch, 1893)

Phorisa bifoveolata Karsch, 1893, p. 65

Syntypes mâles et femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin ?. Lectotype mâle désigné par Hollis (1966, p. 281) et déposé au NHM Londres. Cependant, Jago (1996, p. 74) désigne également comme lectotype le seul spécimen.