

U *Berengueria* sp.

**Cit.:** *Dnopherula* sp. nov. near *rotundifrons*  
Fishpool & Popov, 1984, p. 409-410  
*Dnopherula rotundifrons* (Err. dét., espèce d'Afrique centrale)  
Medler, 1980, p. 39 • Otte, 1995b, p. 147 • Oyidi, 1977 ~ 1978

**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984) - Nigeria (Medler, 1980 • Oyidi, 1977, 1978) - Togo (Fishpool & Popov, 1984)

**BOCAGELLA** I. Bolívar, 1889

Coptacrinae

*Bocagella* I. Bolívar, 1889b, p. 161-162  
Espèce-type : *Bocagella lanuginosa* I. Bolívar, 1889b, p. 162

Genre afrotropical comprenant trois espèces.

U *Bocagella acutipennis acutipennis* Miller, 1932

*Bocagella acutipennis* Miller, 1932, p. 44-45, fig. 25.  
Holotype femelle, Nigeria, Mama District, Akwanga Division, NHM Londres

*B. acutipennis* est considérée ici comme la seule espèce du genre en Afrique de l'Ouest. Les signalisations de *B. lanuginosa*, qui est en fait une espèce d'Angola et de Tanzanie, faites par Karsch et Ramme, sont antérieures à la description de Miller ce qui explique l'erreur de détermination. Le statut de la sous-espèce *B. acutipennis hirsuta* Kevan, 1956, citée à l'origine d'Ouganda, est à préciser, et les signalisations d'Afrique de l'Ouest sont considérées ici comme des erreurs et rapportées à la sous-espèce nominative.

**Syn.:** *Bocagella bolivari* Miller, 1932, p. 43-44. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres  
[Dirsh, 1970, p. 150, avec *Bocagella acutipennis*]

**Cit.:** *Bocagella acutipennis*  
Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Descamps, 1965a, p. 944, 948 • Dirsh, 1963b, p. 211 ~ 1964, p. 57 ~ 1965, p. 248-249 ~ 1970, p. 150-151 • Fishpool & Popov, 1984, p. 391 • Gillon, 1983, p. 301 • Jago, 1967b, p. 253 ~ 1968, p. 250-251 • Johnston, 1956, p. 277 ~ 1968, p. 182 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 544 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 53, 61 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 104-105 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 313 • Miller, 1932, p. 44 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Otte, 1995a, p. 132


*Bocagella acutipennis acutipennis*  
Roy, 2003, p. 333-334, 386, 380, fig. 11

? *Bocagella acutipennis hirsuta*  
Duviard, 1970a, p. 69 ~ 1970b, p. 90-92 • Gillon, 1971, p. 433, 462, 469 ~ 1974a, p. 139, 169-170 ~ 1974b, p. 471, 473, 517, 523 ~ 1983, p. 293 • Otte, 1995a, p. 132

*Bocagella bolivari*  
Phipps, 1970, p. 326

*Bocagella lanuginosa* (Err. dét., espèce d'Afrique centrale)  
Dirsh, 1965, p. 248-249 • Jago, 1968, p. 250 • Karsch, 1893, p. 93 • Ramme, 1929, p. 343, 482

*Bocagella* sp.  
Golding, 1948, p. 566



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Duviard, 1970a,b • Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1983 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Miller, 1932 • Oyidi, 1977, 1978) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Tchad (*mat. exam.*) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Ramme, 1929 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

L'espèce, très caractéristique, est également signalée du Zaïre et de la Tanzanie.