

□ ***Dnopherula punctata* (Uvarov, 1926)**

Aulacothrus punctatus Uvarov, 1926a, p. 432, pl. 47 : f. 11, 12

Holotype mâle, Nord-Nigeria, Azare (en fait Sherifuri, 40 km au nord), NHM Londres

Cit.: *Aulacothrus punctatus*


Golding, 1948, p. 538 • Johnston, 1956, p. 666 • Uvarov, 1926a, p. 432-434, pl. 47 ~ 1953, p. 167

Dnopherula punctata

Cornes & Riley, 1972, p. 15 • Descamps, 1968, p. 575 • Dirsh, 1964, p. 80 ~ 1965, p. 542 ~ 1970, p. 571 • Fishpool & Popov, 1984, p. 409 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 333 • Johnston, 1968, p. 388 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 581, 588-589 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 284-285, 289 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 147 • Roy, 1969a, p. 220

Phonerula punctata

Dirsh, 1965, p. 540-541



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984) - Ghana (Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Uvarov, 1926a, 1953) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce est signalée également de Tanzanie (d'après Jago, 1996b, p. 85).

□ ? ***Dnopherula* sp.**

Cit.: *Dnopherula* sp.

Davey *et al.*, 1959b, p. 587 • Gillon, 1971, p. 419-471

Dist.: Côte d'Ivoire (Gillon, 1971) - Mali (Davey *et al.*, 1959b)

DURONIA Stål, 1876

Acridinae

Phloeoba (*Duronia*) Stål, 1876a, p. 21

Espèce-type : *Phloeoba* (*Duronia*) *chloronota* Stål, 1876b, p. 48 [Karsch, 1900, p. 276]

Syn.: *Rodunia* I. Bolívar, 1908c, p. 100 [Rehn, 1914, p. 77, avec *Duronia*]

On se reportera à Uvarov (1953, p. 142-144) pour un historique de ce genre afrotropical qui comprend deux espèces.

□ ***Duronia chloronota* (Stål, 1876)**

Phloeoba (*Duronia*) *chloronota* Stål, 1876b, p. 48

Syntypes mâle(s), femelle(s), Afrique du Sud-Ouest, Damara, NM Vienne. Lectotype mâle signalé par Dirsh (1970, p. 434).

Syn.: *Phlaeoba sanguinolenta* I. Bolívar, 1889a, p. 96-97. Type femelle, Angola, perdu selon Dirsh (1966)
[Dirsh, 1966, p. 393, avec *Duronia chloronota*]

Phlaeoba viridula var. *liturata* I. Bolívar, 1889a, p. 98. Type Angola, détruit
[Dirsh, 1962, p. 86, avec *Duronia chloronota*]

Phlaeoba laeta I. Bolívar, 1890b, p. 310. Syntypes mâle(s), femelle(s), Madagascar, détruits
[Dirsh, 1963a, p. 255, avec *Duronia chloronota*]

Phlaeoba tricolor Karny, 1907, p. 368-369, pl. 3. Lectotype mâle (Dirsh, 1962), Soudan, NM Vienne
[Dirsh, 1962, p. 86, avec *Duronia chloronota*]

Rodunia acuminata I. Bolívar, 1912b, p. 78. Type mâle (Holotype selon Dirsh, 1962), Zaïre, MRAC Tervuren
[Dirsh, 1962, p. 86, avec *Duronia chloronota*]

Duronia victoriana Rehn, 1914, p. 77. Holotype femelle, Ouganda, MNHU Berlin (DORSA : non recensé)
[Dirsh, 1962, p. 86, avec *Duronia chloronota*]

Cit.: *Duronia chloronota*

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 336 • COPR, 1982, p. 390-392 • Cornes & Riley, 1972, p. 12 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p.

1259, 1266, 1309 ~ 1968, p. 561, 563 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 118-119 • Diop, 1987, p. 21, 27, 33, 36, 58 • Dirsh, 1964, p. 70 ~ 1965, p. 431, 432 ~ 1966, p. 393-394 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 353 • Jago, 1967b, p. 253 ~ 1968, p. 319-320 • Johnsen, 1981a, p. 91 • Johnston, 1956, p. 624-625 ~ 1968, p. 302-303 • Launois, 1978b, p. 182-183 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 72-73 • Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 638-640, 666 ~ 1978b, p. 241-258 ~ 1980b, p. 564, 567 ~ 1984 ~ 1988, p. 50-51 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 186-187 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre et al., 2001, p. 319 • Otte, 1995b, p. 276-277 • Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 85 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 336 • Popov, 1985c, p. 45, 58 ~ 1988, p. 36-37, 45 ~ 1989, p. 92-93 • Roy, 1967, p. 1562 ~ 1969a, p. 216 ~ 1970, p. 700 ~ 1971, p. 406

Duronia laeta

Johnston, 1956, p. 625 • Sjöstedt, 1931b, p. 3

Duronia tricolor

Chapman, 1962, p. 48 • Davey, 1959, p. 127 • Davey et al., 1959b, p. 566-567 • Descamps, 1953, p. 604 • Dirsh, 1956c, p. 280, pl. 54 • Golding, 1948, p. 530, 578-584 • Johnston, 1956, p. 625-626 • Mallamaire, 1948, p. 631 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, p. 626 ~ 1965, p. 626

Duronia sp.

Davey et al., 1959b, p. 567 • Golding, 1934a, p. 277-282, 286 (= *Duronia tricolor* d'après Golding, 1948, p. 526)

Phlaeoba tricolor

Karny, 1907, p. 368-369, pl. 3

Rodunia basalis


Kirby, 1910, p. 139

Rodunia chloronota

Karny, 1915, p. 130-131

Rodunia tricolor

Karny, 1915, p. 130



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (COPR, 1982 • Dahdouh et al., 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • mat. exam.) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Golding, 1948) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Guinée** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Karny, 1915) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey et al., 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • mat. exam.) - **Mauritanie** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971 • mat. exam.) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1934a, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Sénégal** (Bormans, 1883 • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1965, 1967, 1969, 1970 • mat. exam.) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - **Tchad** (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **AO** (Dirsh, 1964, 1965, 1966 • Jago, 1968 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Palisot de Beauvois, 1807 • Popov, 1985c, 1988, 1989)

Cette espèce est signalée de la plupart des pays d'Afrique sub-saharienne, de Madagascar, ainsi que de la côte sud-ouest de l'Arabie.

DURONIELLA I. Bolívar, 1908

Acridinae

Duroniella I. Bolívar, 1908c, p. 100

Espèce-type : *Duronia fracta* Krauss, 1890b, p. 260

Genre afrotropical et paléarctique de près d'une vingtaine d'espèces.