

EPISTAUROS I. Bolívar, 1889

Coptacrinae

Epistaurus I. Bolívar, 1889b, p. 164

Espèce-type : *Epistaurus crucigerus* I. Bolívar, 1889b, p. 164 [Kirby, 1910, p. 471]

Genre comprenant six espèces, trois afrotropicales et trois orientales.


⊃ ***Epistaurus bolivari*** Karny, 1907

Epistaurus bolivari Karny, 1907, p. 309

Holotype femelle, Soudan, Gondokoro, NM Vienne

Cit.: *Epistaurus bolivari*

Chapman, 1962, p. 23 • Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Davey *et al.*, 1959a, p. 89 • Descamps, 1965a, p. 944-947 ~ 1968, p. 546 • Dirsh, 1956c, p. 277, pl. 39 ~ 1965, p. 242 ~ 1966, p. 157 • Golding, 1948, p. 567 • Jago, 1967b, p. 262 ~ 1968, p. 249 • Johnsen, 1981a, p. 85 • Johnston, 1956, p. 275 ~ 1968, p. 177-178 • Karny, 1907, p. 309 ~ 1915, p. 139 • Kirby, 1910, p. 471 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 544 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 102-103 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 313 • Otte, 1995a, p. 135 • Roy, 1969a, p. 211 • Sjöstedt, 1931b, p. 4 • Uvarov, 1926a, p. 445 • Vesey-Fitzgerald, 1964b, p. 350



Dist.: **Burkina Faso** (Dirsh, 1965, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - **Côte d'Ivoire** (Jago, 1968) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Dirsh, 1965, 1966 • Jago, 1968 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1966 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1926a) - **Sénégal** (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a • Vesey-Fitzgerald, 1964b) - **Sierra Leone** (Jago, 1968) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

Malgré un aspect assez différent, il est probable qu'il y ait eu des confusions de cette espèce soit avec *E. succineus* soit avec *E. diopi*. Cette espèce est signalée également du Soudan (type), d'Ouganda et de Tanzanie.

⊃ ***Epistaurus crucigerus*** I. Bolívar, 1889

Epistaurus crucigerus I. Bolívar, 1889b, p.164


Type femelle, Angola ?, détruit (incendie muséum de Lisbonne)

Cit.: *Epistaurus cruciger*

Brunner von Wattenwyl, 1893, p. 160

Epistaurus crucigerus

Descamps, 1965a, p. 944 • Dirsh, 1965, p. 242 ~ 1966, p. 157-158 ~ 1970, p.137 • Fishpool & Popov, 1984, p. 410 • Jago, 1968, p. 250 • Johnston, 1956, p. 275-276 • Karsch, 1893, p. 92-93 • Kirby, 1910, p. 471 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 291 ~ 2001, p. 483-484 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Otte, 1995a, p. 135




Dist.: **Ghana** (Brunner von Wattenwyl, 1893 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Kirby, 1910)

Le statut et l'origine de cette espèce, dont le type est détruit, sont douteux (voir notamment Dirsh, 1970, Fishpool & Popov, 1984, et Mestre, 2001).

⊔ ***Epistaurus diopi* Mestre, 2001**

Epistaurus diopi Mestre, 2001, p. 484-486, fig. 1, 3-5
Holotype mâle, Togo, Agome Yoh, MNHN Paris

Cit.: *Epistaurus diopi*
Mestre, 2001, p. 484-486
Epistaurus sp. 1
Mestre *et al.*, 2001, p. 313




Dist.: Bénin (Mestre, 2001 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Ghana (Mestre, 2001 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Togo (Mestre, 2001 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)

⊔ ***Epistaurus succineus* (Krauss, 1877)**

Coptacra succinea Krauss, 1877, p. 34
Lectotype femelle, Sierra Leone, désigné par Uvarov (1953b, p. 47), NM Vienne. L'autre syntype femelle de la description originale (Natal) s'est avéré être un *Eucoptacra*.

Cit.: *Coptacra succinea*
I. Bolívar, 1889b, p. 165 • Chopard, 1958a, p. 134 • Karsch, 1893, p. 92 • Kirby, 1910, p. 468 • Krauss, 1877, p. 142 ~ 1878, p. 34
Epistaurus bolivari (Err. dét. pour *E. succineus* d'après Roy, 1969a, p. 196)
Roy, 1962, p. 110, 113, 125 ~ 1965, p. 620
Epistaurus succineus
Chapman, 1962, p. 12, 23-24, 60 • Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1965a, p. 944-947 ~ 1968, p. 546 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 110 • Dirsh, 1964, p. 57 ~ 1965, p. 242 ~ 1966, p. 158 • 1970, p. 136-137 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 391, 410 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 139 ~ 1974b, p. 471-472, 527 • Golding, 1948, p. 567, 578-584 • Jago, 1967b, p. 262 ~ 1968, p. 250 • Johnsen, 1970, p. 134, 135, 136 ~ 1981a, p. 85 ~ 1981b, p. 153 • Johnston, 1956, p. 276 ~ 1968, p. 178 • Launois, 1978b, p. 102-103 • Lecoq, 1977, p. 4 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 53 ~ 1980b, p. 544-545 ~ 1984 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 53, 61 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 102-103 ~ 2001, p. 486-487 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 135 • Oyidi, 1976, p. 90 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1959a, p. 138-147 ~ 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 326 • Roy, 1969a, p. 211 ~ 2003, p. 333, 380, 386 • Uvarov, 1953b, p. 47
Epistaurus sp. 2 (mat. exam.)
Mestre *et al.*, 2001, p. 313



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (I. Bolívar, 1889b • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Descamps, 1965a • Gillon, 1971, 1974a, 1974b • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (I. Bolívar, 1889b • Chapman, 1962 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Libéria (Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978) - Sénégal (Descamps, 1965a •

Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1965, 1969a • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (I. Bolívar, 1889b • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1959a, 1962, 1970 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) • **AO** (Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b)

Nous n'avons cartographié que le matériel que nous avons examiné. En effet, la description récente de *E. diopi*, confondue généralement jusqu'ici avec *E. succineus*, rend incertaines un certain nombre de signalisations de cette dernière espèce, en particulier au Ghana et au Togo, où les deux espèces sont présentes.

E. diopi semblant circonscrite au sud-est du Ghana et au sud du Bénin et du Togo, une grande partie des signalisations des autres pays de la région, notamment ceux des zones soudaniennes, doit probablement être rapportée à *E. succineus*.

Il est cependant difficile de savoir quelle est l'extension réelle de cette espèce qui est également signalée du Cameroun, du Congo et du Zaïre. D'autres signalisations d'Angola et du Natal sont à vérifier.

EREMOGRYLLUS Krauss, 1902

Eremogryllinae

Eremogryllus Krauss, 1902b, p. 238-239

Espèce-type : *Eremogryllus hammadae* Krauss, 1902b, p. 231, 239

Syn.: *Sphingonotina* Chopard, 1943c, p. 323 [Dirsh, 1958c, p. 63, avec *Eremogryllus*]

Genre monospécifique ouest-saharien.

⊔ *Eremogryllus hammadae* Krauss, 1902

Eremogryllus hammadae Krauss, 1902b, p. 239-240, fig. 4-6

Syntypes mâles, femelles, Algérie, entre Ouargla et Ghardaïa, dépositaire ? (DORSA : 12 syntypes SMN Stuttgart)

Syn.: *Leptopternis quadriocellata* Werner, 1931, p. 201-202. Syntypes (femelles), Maroc, NM Vienne [Uvarov & Volkonsky, 1939, p. 19, avec *Eremogryllus hammadae*]

Sphingonotina ochracea Chopard, 1943c, p. 323. Holotype femelle, Algérie, MNHN Paris [Dirsh, 1958c, p. 63, avec *Eremogryllus hammadae*]

Cit.: *Eremogryllus hammadae*

Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 60 ~ Johnston, 1956, p. 683-684 ~ 1968, p. 362 • Kirby, 1910, p. 154 • Morales Agacino, 1945, p. 326 ~ 1948, p. 16



Dist.: "Rio de Oro" (Morales Agacino, 1945, 1948)

Les signalisations de Morales Agacino sont les seules de l'espèce dans notre zone d'étude. Jusqu'ici, cette espèce saharienne a été signalée surtout d'Afrique du Nord et de la partie septentrionale du Rio de Oro.

EUCOPTACRA I. Bolívar, 1902

Coptacrinae

Eucoptacra I. Bolívar, 1902b, p. 623, 625 (clé)

Espèce-type : *Acridium (Catantops) praemorsum* Stål, 1860, p. 330

Syn.: *Coptacroides* I. Bolívar, 1912b, p. 95 [Uvarov, 1953b, p. 47, avec *Eucoptacra*]

Genre comprenant environ vingt-cinq espèces afrotropicales et orientales. Trois sont citées pour l'Afrique de l'Ouest.