

Dist.: Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - "French Sudan" (Dirsh, 1965) - Mali (Chopard, 1947 • COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mauritanie (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • mat. exam.) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1950 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Launois-Luong, 1978a, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Tchad (Chopard, 1947 • COPR, 1982 • Descamps, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Togo (Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - AO (Chopard, 1950 • Dirsh, 1965 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

La signalisation de Mauritanie de Johnston (1956) est une erreur pour le Tchad.

Cette espèce terricole et xérophile n'est signalée que de notre zone d'étude, essentiellement de la zone sahélienne.

EUSCHMIDTIA Karsch, 1889

Euschmidtiiinae

Euschmidtia Karsch, 1889, p. 27, 35

Espèce-type : *Euschmidtia sansibarica* Karsch, 1889, p. 35

Ce genre englobe selon Descamps (1973b) douze espèces d'Afrique continentale et une espèce des Seychelles. Hormis *E. congana*, toutes ces espèces ne sont citées qu'à l'est de la Rift Valley (Tanzanie, Malawi, Seychelles)

✉ *Euschmidtia congana* Rehn, 1914

Euschmidtia congana Rehn, 1914, p. 67-68


Holotype femelle, Congostatt (= Zaïre), "Wald zwischen Irumu und Mawambi", MNHU Berlin (DORSA : holotype)

Cit.: *Euschmidtia congana*

Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1964, p. 33, 35, 38, 46-48 ~ 1967a, p. 307 ~ 1973a, p. 829-830 • Dirsh, 1965, p. 35 • Fishpool & Popov, 1984, p. 386 • Gillon, 1974a, p. 130 ~ 1974b, p. 454-455, 522 • Jago, 1967b, p. 246 ~ 1968, p. 217-218 • Johnston, 1968, p. 5 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 45, 60 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 38-39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 310 • Otte, 1994a, p. 63-64

Euschmidtia sansibarica (Err. dét., selon Descamps, 1964, p. 38)

Dirsh, 1965, p. 35 • Jago, 1968, p. 218 • Karsch, 1893, p. 116-117 • La Baume, 1911, p. 321



Dist.: Bénin (Descamps, 1973a • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Ghana (Descamps, 1964, 1967a, 1973a • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - Nigeria (Descamps, 1964a, 1967, 1973a • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Togo (Descamps, 1964a, 1967, 1973a • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Fishpool & Popov, 1984 • Karsch, 1893 • La Baume, 1911 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.)

Cette espèce est signalée également du Cameroun, du Congo, de Centrafrique, d'Ouganda et du Zaïre.

EXOPROPACRIS Dirsh, 1951

Catantopinae

Exopropacris Dirsh, 1951b, p. 75-77

Espèce-type : *Exopropacris sudanica* Dirsh, 1951b, p. 77, fig. 6-9

Genre afrotropical comprenant six espèces selon Jago (1984).

✉ *Exopropacris mellita* (Karsch, 1893)

Catantops mellitus Karsch, 1893, p. 94 (clé), 97

Type femelle (holotype selon Jago, 1984), Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 2 syntypes femelles)