


d'Ivoire (COPR, 1982 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Golding, 1948) - **Gambie** (COPR, 1982 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1926a) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Forsyth, 1966 • Jago, 1967b, 1968, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a • *mat. exam.*) - **Guinée** (COPR, 1982 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Karny, 1915 • *mat. exam.*) - **Guinée-Bissau** (I. Bolívar, 1908c • Golding, 1948 • Jago, 1968) - **Mali** (Boisson, 1961 • COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Jago, 1968, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Popov *et al.*, 1990 • *mat. exam.*) - **Mauritanie** (COPR, 1982 • Jago, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1984 • Launois-Luong, 1978a, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov *et al.*, 1990 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1934a, 1948 • Hergert, 1975 • Jago, 1968, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953, 1954 • Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1956, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Karny, 1907 • Krauss, 1877 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1964b, 1965, 1967, 1969a, 1970 • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1956, 1965, 1970 • Jago, 1964a • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Mallamaire, 1948 • Popov, 1989 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a, 1950b • Roy, 1968)



L'espèce, commune en zones sud-sahélienne et soudanienne, est également signalée du Soudan, d'Éthiopie, d'Ouganda et du Zaïre.

HEMIACRIS Walker, 1870

Hemiacridinae

Hemiacris Walker, 1870a, p. 721 (clé), 789

Espèce-type : *Hemiacris fervens* Walker, 1870b, p. 790

Syn.: *Eremobiella* Schulthess Rechberg, 1909, p. 11 [Uvarov, 1953b, p. 75, avec *Hemiacris*]

Diademacris Ramme, 1929, p. 285 [Dirsh, 1966, p. 106, avec *Hemiacris*]

Phalinus Rehn, 1944, p. 20, 66-69 [Dirsh, 1966, p. 106, avec *Hemiacris*]

Genre afrotropical comprenant neuf espèces arbusticoles ou arboricoles, dont une seule dans notre zone d'étude.

⊂ *Hemiacris uvarovi* Ramme, 1929

Hemiacris uvarovi Ramme, 1929, p. 290, 291, fig. 17d, pl. 5 : f. 8

Holotype mâle, Nord-Nigeria, Azare, NHM Londres

Cit.: *Hemiacris uvarovi*

Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1966, p. 109 • Fishpool & Popov, 1984, p. 328 • Gillon, 1974a, p. 133 ~ 1974b, p. 461, 521, 525 • Golding, 1948, p. 577 • Lecoq, 1980b, p. 539, 541 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 47, 60 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 80-81 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 79 • Oyidi, 1976, p. 90 • Ramme, 1929, p. 290, 291, pl. 5 • Roy, 1967, p. 1557 ~ 1969a, p. 198-199, 209, 221-232 • Uvarov, 1943b, p. 388

Hemiacris sp. (identification sous réserve de la bonne affectation générique, *H. uvarovi* étant la seule espèce ouest-africaine)


Chapman, 1962, p. 35 • Jago, 1968, p. 230

Phalinus uvarovi

Descamps, 1965a, p. 939 • Dirsh, 1956c, p. 279, pl. 49 ~ 1965, p. 201 • Jago, 1967b, p. 254 ~ 1968, p. 229-230 • Johnston, 1956, p. 217 ~ 1968, p. 148 • Lecoq, 1977, p. 4

Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Burkina Faso** (Lecoq, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1966 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre,

1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976 • Ramme, 1929 • Uvarov, 1943b) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1967, 1969a) - **AO** (Lecoq, 1980b)



Cette espèce n'est citée que de notre zone d'étude.

HEMIERIANTHUS Saussure, 1903

Chorotypinae

Hemierianthus Saussure, 1903, p. 412, 413

Espèce-type : *Hemierianthus gabonicus* Saussure, 1903, p. 413

Syn.: *Chescirtypus* C. Bolívar, 1930, p. 54, 62 [C. Bolívar, 1932, p. 671, 679, avec *Hemierianthus*]

Genre afrotropical d'une douzaine d'espèces. Il existe un très fort dimorphisme sexuel dans ce genre et l'appariement des sexes est difficile, difficulté encore accentuée par la rareté du matériel pour la plupart des espèces.

⊃ ***Hemierianthus assiniensis*** (C. Bolívar, 1930)

Orchetypus (Chescirtypus) assiniensis C. Bolívar, 1930, p. 70-71, fig. 35-37

Holotype femelle, Côte d'Ivoire, Assinie, MNHN Paris

Cit.: *Hemierianthus assiniensis*

Descamps, 1967a, p. 299, 300 • Dirsh, 1965, p. 18 • Jago, 1967b, p. 238, 239, 241, 250 ~ 1968, p. 216-217 • Johnston, 1956, p. 1 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115, 122 • Otte, 1994a, p. 4

Orchetypus (Chescirtypus) assiniensis

C. Bolívar, 1930, p. 70-71



Dist.: **Côte d'Ivoire** (C. Bolívar, 1930 • Descamps, 1967a • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette espèce a été connue pendant longtemps uniquement par l'holotype femelle. La signalisation du Ghana (1967b, 1968) correspond à un mâle que Jago considère probablement conspécifique de *H. assiniensis*.

⊃ ***Hemierianthus curtithorax*** (Karsch, 1890)

Choroetypus curtithorax Karsch, 1890, p. 258, fig.

Type femelle, Cameroun, Kribi, MNHU Berlin (DORSA : holotype femelle)

Syn.: *Hemierianthus camerunensis* I. Bolívar, 1903b, p. 301-302. Type mâle, Cameroun, MNCN Madrid

[C. Bolívar, 1932, p. 679, avec *Hemierianthus curtithorax*]

Descamps (1967) considère que cette synonymie doit être vérifiée, les types des deux espèces étant de sexe différent.

Cit.: *Hemierianthus curtithorax*

Descamps, 1967a, p. 296, 299, 301 • Dirsh, 1965, p. 18 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 4

Scirtotypus curtithorax

Kirby, 1910, p. 68

Dist.: **Nigeria** (Descamps, 1967a • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997)