


L'espèce est également connue du Cameroun et de Bioko (ex Fernando Poo).

□ *Hemierianthus parki* (C. Bolívar, 1930)

Orchetypus (Chescirtypus) parki C. Bolívar, 1930, p. 68
Holotype femelle, Nigeria, Ifon, NHM Londres

Cit.: *Hemierianthus parki*
Descamps, 1967a, p. 301 • Dirsh, 1965, p. 18 • Johnston, 1956, p. 3 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115
• Otte, 1994a, p. 5
Orchetypus (Chescirtypus) parki
C. Bolívar, 1930, p. 68



Dist.: Nigeria (C. Bolívar, 1930 • Descamps, 1967a • Dirsh, 1965 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997)

L'holotype femelle est l'unique signalisation de cette espèce.

HETERACRIS Walker, 1870

Eyprepocnemidinae

Heteracris Walker, 1870b, p. 655

Espèce-type : *Acridium herbaceum* Audinet-Serville, 1838, p. 684 [Kirby, 1910, p. 555-556]

Syn.: *Thisoicetrus* Brunner von Wattenwyl, 1893, p. 150 [Dirsh, 1958c, p. 53, avec *Heteracris*]
Bibulus I. Bolívar, 1914a, p. 31 [Popov, 1950, p. 134, avec *Thisoicetrus*]
Thisoicetrellus Uvarov, 1921b, p. 129-130 [Grunshaw, 1991, p. 11, avec *Heteracris*]
Parathisoiacetrus Ramme, 1929, p. 476 [Grunshaw, 1991, p. 12, avec *Heteracris*]
Thisoicetrinus Uvarov, 1921b, p. 128-129 [Grunshaw, 1991, p. 12, avec *Heteracris*]
Horaeocerus Saussure, 1899, p. 635 [Wintrebert, 1972, p. 78, avec *Heteracris*]
Cyclopternacris Ramme, 1928, p. 114 [Grunshaw, 1991, p. 12, avec *Heteracris*]
Paraeuprepocnemis Brunner von Wattenwyl, 1893, p. 151 [Grunshaw, 1991, p. 12, avec *Heteracris*]
Asmera I. Bolívar, 1914a, p. 6 [Grunshaw, 1991, p. 12, avec *Heteracris*]

Le genre *Heteracris* a été révisé récemment par Grunshaw (1991). Il reconnaît plus d'une quarantaine d'espèces dont la grande majorité sont afrotropicales, sept d'entre elles étant endémiques de Madagascar.


□ *Heteracris adspersa* (Redtenbacher, 1889)

Euprepocnemis adspersa Redtenbacher, 1889, p. 24, 30-31

Syntypes mâles, femelles, Turcomania (Transcapia), Askhabad, Duschak, Elisabetpol (= Kirovabad en Azerbaïdjan).
Lectotype mâle, Kirovabad, désigné par Grunshaw (1991, p. 37), NM Vienne.

Syn.: *Heteracris adspersa massai* Galvagni, 1978, p. 163-174. Holotype mâle, Sardaigne, MCSN Gênes
[Grunshaw, 1991, p. 37, avec *Heteracris adspersa*]

Cit.: *Heteracris adspersa* (ou -us)
Descamps & Le Breton, 1973, p. 112 • Dirsh, 1965, p. 288, 289 • Grunshaw, 1991, p. 13-16, 37-39, 60 • Johnston, 1968, p. 211 • Mestre, 1988, p. 122 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Otte, 1995a, p. 183
Thisoicetrus adspersus
Kirby, 1910, p. 559 • Johnston, 1956, p. 396-397



Dist.: **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Grunshaw, 1991 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Le Sénégal est la seule signalisation sub-saharienne de cette espèce dont l'aire de répartition s'étend du sud du pourtour méditerranéen (sud de l'Espagne) à l'Arabie et, au-delà, jusqu'au Pakistan et à l'Ouzbékistan.

□ ***Heteracris annulosa* Walker, 1870**

Heteracris annulosa Walker, 1870b, p. 673 (clé), 674

Syntypes mâles (extrêmes de taille) selon Walker, pas de localité, NHM Londres. Holotype femelle, NHM Londres, selon Grunshaw (1991, p. 22).

Syn.: *Acridium continuum* Walker, 1871, p. 61. Holotype femelle, Sinai, NHM Londres
[Uvarov, 1939a, p. 379, avec *Thisoicetrus annulosus annulosus*]

Pezotettix (Euprepocnemis) charpentieri Stål, 1873b, p. 75. Lectotype mâle, Tunisie, NR Stockholm
[Uvarov, 1939a, p. 377, avec *Thisoicetrus annulosus annulosus*]

Thisoicetrus brevipes I. Bolívar, 1936, p. 416. Holotype mâle, Maroc, MNHN Madrid
[Grunshaw, 1991, p. 22, avec *Heteracris annulosa*]

Cit.: *Euprepocnemis annulosa*
Kirby, 1910, p. 560
Heteracris annulosa (ou -us)
Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • COPR, 1982, p. 250-251 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29 • Descamps, 1965a, p. 951 ~ 1965b, p. 1308 ~ 1968, p. 549, 551 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 112 • Dirsh, 1965, p. 288, 289 • Fishpool & Popov, 1984, p. 338 • Grunshaw, 1991, p. 13-16, 22-27, 29 • Jago, 1983a, p. 181, 187, 189 • Johnsen, 1981b, p. 153 • Johnston, 1968, p. 211-212 • Launois, 1978b, p. 128-129 • Launois-Luong, 1978a, p. 581-582 ~ 1978b, p. 237-240 ~ 1980b, p. 774-814 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 37 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 56 ~ 1980b, p. 551-553 ~ 1988, p. 104-105 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 120-121 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Otte, 1995a, p. 186 • Popov, 1985c, p. 45, 58, 64 ~ 1988, p. 36-37, 45 • Roy, 1971, p. 404

Heteracris annulosus annulosus


Davey *et al.*, 1959a, p. 102

Thisoicetrus annulosus

Chopard, 1941, p. 48 ~ 1943c, p. 410-411 ~ 1952, p. 471 ~ 1963, p. 568 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 202 • Johnston, 1956, p. 397 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Morales Agacino, 1947, p. 276

Thisoicetrus annulosus annulosus

Chopard, 1950, p. 144



Dist.: **Bénin** (Grunshaw, 1991 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Burkina Faso** (Grunshaw, 1991 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Grunshaw, 1991 • Jago, 1983a • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971 • mat. exam.) - **Niger**

(Chiffaud & Mestre, 1992 • Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chopard, 1943c, 1950 • COPR, 1982 • Grunshaw, 1991 • Launois-Luong, 1978a, 1978b, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Grunshaw, 1991 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "Rio de Oro" (Morales Agacino, 1947) - **Sénégal** (Chopard, 1943c, 1952 • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Tchad** (Chopard, 1963 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **AO** (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1985c, 1988)

Cette espèce est citée vers l'est jusqu'en Somalie, d'Afrique du Nord (du Maroc à l'Égypte) et d'Arabie.

□ *Heteracris coeruleascens* (Stål, 1876)

Euprepocnemis coeruleascens Stål, 1876a, p. 16

Type (holotype mâle selon Grunshaw, 1991, p. 41), Érythrée, Massawa, NM Vienne. Uvarov (1939a, p. 382) parle de l'examen d'un mâle et d'une femelle types provenant de la collection Brunner à Vienne.

Syn.: *Tylotropidius brunni* Giglio-Tos, 1907b, p. 31. Holotype mâle, Somalie, MRSN Turin
[Uvarov, 1939a, p. 382, avec *Bibulus coeruleascens*]
[Popov, 1950, p. 134, avec *Thisoicetrus coeruleascens*]

Bibulus desertus Uvarov, 1921, p. 131. Holotype mâle, Arabie Saoudite, NHM Londres
[Popov, 1950, p. 134, avec *Thisoicetrus coeruleascens*]

Heteracris rantaë africanus Schmidt, 1982, p. 72. Holotype mâle, Somalie, MZ Florence
[Grunshaw, 1991, p. 41, avec *Heteracris coeruleascens*]

Cit.: *Bibulus brunni*
Golding, 1934a, p. 293-294


Bibulus coeruleascens
Golding, 1948, p. 577, 580, 584

Heteracris coeruleascens

COPR, 1982, p. 254 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Davey *et al.*, 1959a, p. 102 • Descamps, 1965a, p. 951 ~ 1968, p. 549, 551 • Dirsh, 1965, p. 288, 289 • Fishpool & Popov, 1984, p. 392 • Grunshaw, 1991, p. 13-16, 41-43 • Johnston, 1968, p. 212 • Lecoq, 1980b, p. 551-552 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 122, 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 315 • Otte, 1995a, p. 184-185 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Roy, 1965, p. 620-621

Thisoicetrus coeruleascens

Kirby, 1910, p. 559 • Popov, 1950, p. 134 • Johnston, 1956, p. 399



Dist.: **Bénin** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1934a, 1948 • Grunshaw, 1991 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Popov, 1950) - **Sénégal** (Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1965 • mat. exam.) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **AO** (Lecoq, 1980b)

Cette espèce est citée vers l'est jusqu'en Somalie, descendant via le Kenya et la Tanzanie jusqu'au Mozambique. Elle est également signalée d'Arabie.

□ *Heteracris guineensis* (Krauss, 1890)

Euprepocnemis guineensis Krauss, 1890, p. 659

Syntypes mâle(s), femelles, Ghana, Akem, SMN Stuttgart. Dans sa révision, Grunshaw (1991, p. 206) indique un holotype mâle. Dirsh (1970, p. 206) parlait d'un lectotype (désigné par ?) ce qui paraît plus logique, en accord avec l'indication de plusieurs spécimens faite par Krauss dans sa description. (DORSA : holotype mâle, SMN Stuttgart).

Syn.: *Euprepocnemis guineensis* var. *maculosa* Krauss, 1890, p. 660. Holotype femelle, Sao Thomé, SMN Stuttgart (DORSA : 1 syntype femelle)
[Sjöstedt, 1929a, p. 39, avec *Thisoicetrus guineensis*]
Thisoicetrus pulchripes aurantica Uvarov, 1921b, p. 126. Holotype mâle, Sierra Leone, NHM Londres
[Grunshaw, 1991, p. 66, avec *Heteracris guineensis*]

Cit.: *Euprepocnemis guineensis*

Karsch, 1893, p. 104 • Kirby, 1910, p. 560 (*E. guinneensis* !) • Krauss, 1890, p. 659 • Sjöstedt, 1918, p. 14-15
Heteracris guineensis

Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1964, p. 58 ~

1965, p. 288, 289 • Gillon, 1974a, p. 141 • Grunshaw, 1991, p. 13-16, 66-68 • Jago, 1967b, p. 260 • Johnsen, 1970, p. 137, 138 • Johnston, 1968, p. 213 • 1978 ~ 1991 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 49, 57-58, 61 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 315 • Otte, 1995a, p. 190 • Roy, 1969b, p. 54 ~ 2003, p. 338, 380, 387

Heteracris pulchripes guineensis

Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Fishpool & Popov, 1984, p. 393 • Jago, 1968, p. 280-281

Thisoicetrus guineensis

Chapman, 1962, p. 60 • Chopard, 1958a, p. 139 • Johnston, 1956, p. 400 • Sjöstedt, 1918, p. 13

Thisoicetrus pulchripes aurantica


Uvarov, 1921b, p. 126

Thisoicetrus pulchripes guineensis

Chapman, 1961, p. 270 ~ 1962, p. 13, 32

Thisoicetrus pulchripes var. guineensis

Golding, 1948, p. 575



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Grunshaw, 1991 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Côte d'Ivoire** (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a • Grunshaw, 1991 • Le Gall, 1989, 1991 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969b • mat. exam.) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1964, 1965 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1991 • Jago, 1967b, 1968 • Krauss, 1890 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • Sjöstedt, 1918 • mat. exam.) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • mat. exam.) - **Nigeria** (Chopard, 1958a • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1991 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Sierra Leone** (Grunshaw, 1991 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1921b) - **Togo** (Dirsh, 1964, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.)


Cette espèce est également signalée du Zaïre, d'Ouganda, d'Angola et des îles de Sao Thomé et Principe.

□ ***Heteracris harterti* (I. Bolívar, 1913)**

Thisoicetrus harterti I. Bolívar, 1913a, p. 614-615

Syntypes femelles, Algérie, Biskra, NHM Londres. Lectotype femelle, NHM Londres, désigné par Grunshaw (1991).

Syn.: *Thisoicetrus littoralis bolivari* Uvarov, 1923f, p. 76. Holotype mâle, Algérie, NHM Londres
[Uvarov, 1939a, p. 76, avec *Thisoicetrus harterti*]



Cit.: *Heteracris harterti*

Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959a, p. 102 • Descamps, 1965a, p. 951 ~ 1968, p. 549, 552 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 112 • Dirsh, 1965, p. 288, 289 • Fishpool & Popov, 1984, p. 338 • Grunshaw, 1991, p. 13-16, 27-29 • Jago, 1983a, p. 181, 187 • Johnston, 1968, p. 213 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1980a, p. 56 ~ 1980b, p. 551-553 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 122-123 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Otte, 1995a, p. 18-187 • Oyidi, 1976, p. 88 • Popov *et al.*, 1990, p. 80-81

Thisoicetrus harterti

Chopard, 1941b, p. 50 ~ 1943c, p. 410 ~ 1950, p. 145 ~ 1952, p. 471 ~ 1963, p. 568 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 203

- Golding, 1948, p. 574-575, 578-584 • Johnston, 1956, p. 401 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Morales Agacino, 1948, p. 16
• Uvarov, 1939a, p. 377, 380

Thisoicetrus littoralis (Err. dét. pour *Thisoicetrus harterti* selon Golding, 1948, p. 526)

Golding, 1934a, p. 278-282, 292 ~ 1948, p. 526 • Johnston, 1956, p. 402-403

Heteracris leani (Err. dét. pour *Heteracris harterti* selon Descamps & Le Breton, 1973, p. 113)

Roy, 1964b, p. 1190

- Dist.:** **Burkina Faso** (Lecoq, 1977, 1980a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - "French Sudan" (Dirsh, 1965) - **Mali** (Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Grunshaw, 1991 • Jago, 1983a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov *et al.*, 1990 • mat. exam.) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941b, 1950 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov *et al.*, 1990 • mat. exam.) - **Nigeria** (Cernes & Riley, 1972 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1991 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976 • Uvarov, 1939a) - "Rio de Oro" (Morales Agacino, 1948) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964b • mat. exam.) - **Tchad** (Chopard, 1941b, 1943c, 1963 • Descamps, 1968 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **AO** (Fishpool & Popov, 1984 • Mallamaire, 1948 • Lecoq, 1980b • Popov *et al.*, 1990 • Uvarov, 1939a)

Cette espèce est citée également des pays du Maghreb.

□ *Heteracris jeannelli* (I. Bolívar, 1914)

Thisoicetrus jeannelli I. Bolívar, 1914a, p. 26-27

Syntypes mâle(s), femelle(s), Afrique de l'Ouest. Lectotype femelle, Togo, MNCN Madrid, désigné par Dirsh (1958c, p. 54).

Syn.: *Thisoicetrus nigrovittatus* I. Bolívar, 1914a, p. 25-26. Type femelle (holotype selon Grunshaw, 1991), Congo ?, MNCN Madrid [Dirsh, 1970, p. 208, avec *Heteracris pulchripes jeannelli*]

Cit.: *Heteracris jeannelli*

Grunshaw, 1991, p. 13-16, 60, 67, 69 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 315 • Otte, 1995a, p. 191

? *Heteracris pulchripes* (Err. dét., non présent en Afrique de l'Ouest)

Dirsh, 1965, p. 288, 289 (partie). Identification, sous toute réserve, liée au fait que Dirsh liste également *H. guineensis*, autre espèce antérieurement considérée, comme *H. jeannelli*, sous-espèce de *H. pulchripes*.

Heteracris pulchripes jeannelli

Cernes & Riley, 1972, p. 9 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1958c, p. 54 ~ 1970, p. 207-208 • Gillon, 1974a, p. 141 • Jago, 1967b, p. 260 ~ 1968, p. 281 • Johnston, 1968, p. 214 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 49

Thisoicetrus jeannelli


I. Bolívar, 1914a, p. 26 • Chapman, 1962, p. 61

Thisoicetrus pulchripes jeannelli

Chapman, 1961, p. 269-270 ~ 1962, p. 13, 32-33 • Johnston, 1956, p. 405

Thisoicetrus pulchripes var. *jeannelli*

Golding, 1948, p. 575



- Dist.:** **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Ghana** (I. Bolívar, 1914a • Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1991 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Guinée** (mat. exam.) - **Nigeria** (Cernes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1991 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • mat. exam.) - **Togo** (I. Bolívar, 1914a • Dirsh, 1958c, 1965, 1970 • Grunshaw, 1991 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette espèce n'est, hormis une signalisation douteuse du Congo, citée que de notre zone d'étude.

□ *Heteracris leani* (Uvarov, 1941)

Thisoicetrus leani Uvarov, 1941a, p. 64

Holotype mâle, Nord-Nigeria, Kalkala, NHM Londres


Cit.: *Heteracris leani*

Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • COPR, 1982, p. 254 • Cernes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959a, p. 102 • Descamps, 1965a, p. 951 ~ 1965b, p. 1308 ~ 1967b, p. 656 ~ 1968, p. 549, 552-553 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 112 • Dirsh, 1965, p. 288, 289 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 338 • Grunshaw, 1991, p. 13-16, 75, 79-81 • Johnston, 1968, p. 161

213 • Launois, 1978b, p. 130-131 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 40 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 241-258 ~ 1980a, p. 55-56 ~ 1980b, p. 551-552 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 120-121 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 315 • Otte, 1995a, p. 193 • Oyidi, 1976, p. 88 ~ 1977 ~ 1978, p. 6, 11.

Thisoicetrus leani

Descamps, 1953, p. 601, 603, 605 • Golding, 1947, p. 80 ~ 1948, p. 575, 578-584 • Johnston, 1956, p. 401-402 • Uvarov, 1941a, p. 64-65, 67



Dist.: **Bénin** (Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - **Mali** (Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Fishpool & Popov, 1984 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1941a) - **Mauritanie** (Grunshaw, 1991 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1947, 1948 • Grunshaw, 1991 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1941a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Tchad** (Descamps, 1967b, 1968 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (COPR, 1982 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce est également signalée du Soudan.

□ ***Heteracris littoralis* (Rambur, 1838)**

Gryllus littoralis Rambur, 1838, p. 78

Holotype mâle, Espagne, perdu. Néotype mâle, Espagne, Almérie, près de Vera, NHM Londres, désigné par Grunshaw (1991, p. 17)

Syn.: *Cyrtacanthacris notata* Walker, 1870a, p. 574-575. Holotype femelle, Égypte, NHM Londres


[Uvarov, 1939a, p. 381, avec *Thisoicetrus littoralis similis*]

Caloptenus similis Brunner von Wattenwyl, 1861, p. 224-225. Syntypes mâles, femelle(s), Égypte et Syrie (Égypte désignée comme localité-type par Uvarov, 1939a), perdus ? (Uvarov, 1939a). Grunshaw (1991) parle d'un holotype femelle perdu. [Grunshaw, 1991, p. 18, avec *Heteracris littoralis*]

Thisoicetrus littoralis var. *aethiopica* Carl, 1916, p. 493. Holotype mâle, Sénégal, MHN Genève
[Grunshaw, 1991, p. 18, avec *Heteracris littoralis*]

Thisoicetrus littoralis asiaticus Uvarov, 1933c, p. 230. Holotype mâle, Iran, ZI Saint-Pétersbourg
[Uvarov, 1939a, p. 381, avec *Thisoicetrus littoralis*]

Thisoicetrus bituberculatus Bey-Bienko, 1948a, p. 72, fig. 7. Holotype mâle, Iran, ZI Saint-Pétersbourg
[Grunshaw, 1991, p. 18, avec *Heteracris littoralis*]



- Cit.:** *Heteracris littoralis*
 COPR, 1982, p. 251-253 • Davey *et al.*, 1959a, p. 103 • Descamps, 1968, p. 549, 553 • Dirsh, 1965, p. 288, 289 • Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207, 212 ~ 1984, p. 40-41 ~ 1988, p. 179-188 • Fishpool & Popov, 1984, p. 393 • Grunshaw, 1991, p. 13-22 • Johnston, 1968, p. 213-214 • Launois *et al.*, 1988, p. 157 • Lecoq, 1980b, p. 551-553 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 122-123 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Otte, 1995a, p. 187-188
Thisoicetus littoralis
 Chopard, 1952, p. 471 ~ 1958c, p. 13 • Johnston, 1956, p. 402-403 • Kirby, 1910, p. 558 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Saraiva, 1961, p. 134, 150, 151 • Veiga, 1967, p. 491
Thisoicetus littoralis similis
 Chopard, 1950, p. 145
Thisoicetus littoralis var. *aethiopica*
 Carl, 1916, p. 493-494
- Dist.:** **Cap-Vert** (Chopard, 1958c • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Duranton *et al.*, 1983, 1984 • Grunshaw, 1991 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saraiva, 1961 • Veiga, 1967 • mat. exam.) - **Mali** (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Niger** (Chopard, 1950 • Grunshaw, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Sénégal** (Carl, 1916 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Mallamaire, 1948 • Lecoq, 1980b)
 La signalisation du Nigeria (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Medler, 1980), sans localité, est très probablement issue de Golding (1934a) et doit être rapportée à *H. harterti* d'après Golding (1948). Cette espèce a une vaste répartition s'étendant vers le nord à l'Afrique du Nord et au sud de l'Espagne, vers l'est jusqu'à la Somalie, et via la péninsule arabique, jusqu'à Inde.
- ***Heteracris* sp.**
- Cit.:** *Euprepocnemis coerulipes* (Err. dét., non présent en Afrique de l'Ouest)
 Sjöstedt, 1913, p. 25
Heteracris annulosa et *Heteracris harterti* (espèces traitées ensemble rendant les données biologiques et chorologiques imprécises)
 Fishpool & Popov, 1984, p. 338
Thisoicetus coerulipes (Err. dét., non présent en Afrique de l'Ouest)
 Johnston, 1956, p. 400
Heteracris pulchripes (Err. dét., non présent en Afrique de l'Ouest selon Grunshaw, 1991)
 Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Johnsen, 1981b, p. 153 • Phipps, 1970, p. 328 ~ 1971
Heteracris vinaceus (Err. dét., non présent en Afrique de l'Ouest selon Grunshaw, 1991)
 ? Jago, 1968, p. 281-282 • Dirsh, 1970, p. 208-209 • Johnsen, 1981b, p. 153
Heteracris sp.
 Descamps, 1965a, p. 951
Thisoicetus pulchripes var. *coerulipes* (Err. dét., non présent en Afrique de l'Ouest)
 Golding, 1948, p. 575
- Dist.:** **Ghana** (Johnsen, 1981b) - **Liberia** (Johnsen, 1981b) - **Mali** (Descamps, 1965a • Fishpool & Popov, 1984) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1948) - **Sierra Leone** (Phipps, 1970, 1971) - **Togo** (Dirsh, 1970 • ? Jago, 1968 • Sjöstedt, 1913)

HETEROPTERNIS Stål, 1873

Oedipodinae

Heteropternis Stål, 1873b, p. 117 (clé), 128

Espèce-type : *Heteropternis pyrrhoscelis* Stål, 1873b, p. 128 (= *H. respondens* Walker, 1859)
 Syn.: *Thaleius* Finot, 1908a, p. 27-28 [Uvarov, 1954b, p. 127, avec *Heteropternis*]

Genre comprenant près d'une vingtaine d'espèces des régions afrotropicale, orientale et australienne.

□ ***Heteropternis couloniana* (Saussure, 1884)**

Ditopternis couloniana Saussure, 1884, p. 125-126
 Type femelle, Guinée ?, Alatife, dépositaire ?

Syn.: *Heteropternis vittata* Kirby, 1902a, p. 75. Holotype femelle, Zambie, NHM Londres
 [Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Heteropternis couloniana*]
Thaleius lemagneni Finot, 1908a, p. 29. Holotype femelle, Côte d'Ivoire, MNHN Paris
 [Uvarov, 1954b, p. 127, avec *Heteropternis couloniana*]
Heteropternis citrina I. Bolívar, 1912b, p. 86-87. Syntypes mâle(s), femelle(s), Zaïre, MRAC Tervuren
 [Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Heteropternis couloniana*]

Cit.: *Ditopternis couloniana*
 Saussure, 1884, p. 125-126
Heteropternis couloniana
 I. Bolívar, 1894, p. clxi • Chapman, 1962, p. 14, 41-42 • Chopard, 1958a, p. 143 • COPR, 1982, p. 437-438 • Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Dirsh, 1963b, p. 218 ~ 1965, p. 475-477 ~ 1966, p. 420 ~ 1970, p. 484-486 • Fishpool & Popov, 1984, p. 404 • Gillon, 1974a, p. 157 • Golding, 1948, p.