

**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • Mestre & Chiffaud, 1997)  
L'aire de répartition vers l'est s'étend jusqu'à l'Éthiopie, et vers le sud jusqu'à l'Angola et à la Tanzanie.

**MASTACHOPARDIA** Descamps, 1964

Euschmidtinae

*Mastachopardia* Descamps, 1964, p. 30, 63-64

Espèce-type : *Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964, p. 64

Genre afrotropical comprenant une dizaine d'espèces selon Descamps (1973a), dont deux endémiques à notre zone d'étude.


⊂ *Mastachopardia jagoi* Descamps, 1964

*Mastachopardia jagoi* Descamps, 1964, p. 65-68, fig. 64b-64g (p. 66)

Holotype mâle, Liberia, N.E. of Bomi Hills, mining area N. of Monrovia, NHM Londres

**Cit.:** *Mastachopardia jagoi*

Descamps, 1964, p. 65-68 ~ 1967, p. 307 ~ 1973a, p. 833 • Johnston, 1968, p. 7 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 65



**Dist.:** Liberia (Descamps, 1964, 1973a • Mestre & Chiffaud, 1997)

C'est la seule signalisation de cette espèce, connue uniquement par le mâle.

⊂ *Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964

*Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964, p. 64-65, fig. 62-64 (p. 61) et 64a (p. 65)


Holotype femelle, Guinée, Monts Nimba (camp Zougoué), MNHN Paris

**Cit.:** *Euschmidtia* sp.

Dirsh, 1963b, p. 207

*Mastachopardia zougueana*

Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1964, p. 64-65 ~ 1967, p. 308 ~ 1973a, p. 833, 834 ~ 1973b, p. 225 • Johnston, 1968, p. 7 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 45, 60 • Mestre, 1988, p. 38-39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 65 • Roy, 2003, 314-315, 385, fig. 1



**Dist.:** Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Descamps, 1964 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Guinée (Descamps, 1964, 1973a • Dirsh, 1963b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - AO (Mestre, 1988)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**MAURA** Stål, 1873

Pyrgomorphinae

*Maura* Stål, 1873a, p. 51

Espèce-type : *Petasia rubro-ornata* Stål, 1855, p. 352

Genre afrotropical comprenant quatre espèces selon Kevan (1977).

u ***Maura lurida*** (Fabricius, 1781)

*Gryllus luridus* Fabricius, 1781, p. 366

Type "Africa aequinoctialis". Holotype femelle, selon Uvarov (1925d) et Kevan (1977), NHM Londres

**Syn.:** *Petasia hecate* Gerstäcker, 1869, p. 217. Holotype femelle, MNHU Berlin (DORSA : holotype)

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 223, avec *Maura lurida*]

*Maura apicalis* I. Bolívar, 1884b, p. 479, 498. Type femelle (holotype selon Kevan, 1977), Éthiopie, NM Vienne

[Uvarov, 1925d, p. 281, avec *Maura lurida*]

*Maura flavifrons* I. Bolívar, 1894, p. clxii. Type mâle (holotype selon Kevan, 1977), Togo, MNCN Madrid

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 223, avec *Maura lurida*]

*Maura venusta* I. Bolívar, 1904b, p. 320-321. Holotype femelle, Kilimandjaro, NM Vienne

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 223, avec *Maura lurida*]

Nous n'avons pas retenu la synonymie de *Maura rugulosa* I. Bolívar, 1884b, faite avec *Maura lurida* par Dirsh (1970, p. 32), *M. rugulosa* étant selon Kevan & Akbar (1974, p. 223) un synonyme de *Maura rubroomata* Stål.

**Cit.:** *Acrydium luridum*

Olivier, 1791, p. 222

*Maura apicalis*

I. Bolívar, 1894, p. clxiii ~ 1904b, p. 321 ~ 1909a, p. 13 • Descamps, 1953, p. 604 • Karsch, 1893, p. 84, • Roy, 2003, p. 319, 379, 385, fig. 4

*Maura flavifrons*

I. Bolívar, 1894, p. clxii ~ 1904b, p. 321 ~ 1909a, p. 13 • Comes & Riley, 1972, p. 6 • Dirsh, 1965, p. 121, 122 • Johnston, 1956, p. 133 • Phipps, 1970, p. 321

*Maura lurida*

COPR, 1982, p. 59-60 • Comes & Riley, 1972, p. 6 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1965, p. 121, 122 • Fishpool & Popov, 1984, p. 386 • Golding, 1948, p. 548 • Jago, 1967b, p. 242 ~ 1968, p. 221-222 • Johnston, 1956, p. 134 ~ 1968, p. 92 • Kevan, 1977, p. 310-312 • Kevan & Roy, 1971, p. 262 • Kirby, 1910, p. 306 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 46, 60 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 64-65 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 310 • Otte, 1994b, p. 69-70 • Oyidi, 1976, p. 83 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 21


*Maura rubro-ornata* ou *rubroomata* (erreur de localité, non présente en Afrique de l'Ouest)

I. Bolívar, 1904b, p. 319, 322-323 • Dirsh, 1965, p. 121, 122 • Johnston, 1956, p. 134

Selon Kevan (1977, p. 313), la citation de Guinée de cette espèce valide d'Afrique du Sud, due à Bolívar et reprise par Johnston et Dirsh, résulte d'une erreur d'étiquetage.

*Maura* sp. (identification sous réserve de la bonne affectation générique, *M. lurida* étant la seule espèce ouest-africaine)

Roy, 1965, p. 615, 617



**Dist.:** **Bénin** (I. Bolívar, 1904b, 1909a • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (I. Bolívar, 1904b • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (I. Bolívar, 1909a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Comes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1965) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - **Togo** (I. Bolívar, 1894, 1904b, 1909a • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (I. Bolívar, 1904b • Kevan, 1977 • Olivier, 1791?)

Cette espèce est signalée vers l'est jusqu'en Éthiopie, descendant vers le sud par le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique. Elle est également citée du Zaïre.

**MAZAEA** Stål, 1876

Hemiacridinae

*Mazaea* Stål, 1876a, p. 54

Espèce-type : *Mazaea granulosa* Stål, 1876a, p. 54

Genre afrotropical monospécifique.