

ONCOTHERICLES Descamps, 1977

Thericleinae

Oncothericles Descamps, 1977, p. 310-311

Espèce-type : *Symbellia biplagiata* I. Bolívar, 1899, p. 290, pl. 10 : f. 19, 19a-d

Genre afrotropical monospécifique.


⊃ ***Oncothericles nigeriae*** Descamps, 1977

Oncothericles nigeriae Descamps, 1977, p. 316, fig. 1378-1385

Holotype mâle, Nord-Nigeria, région de Gombe, près de Difa, NHM Londres

Cit.: *Oncothericles nigeriae*

Descamps, 1977, p. 316 • Otte, 1994a, p. 103



Dist.: Nigeria (Descamps, 1977 • Otte, 1994a)

C'est la seule signalisation de cette petite espèce aptère.

ORNITHACRIS Uvarov, 1924

Cyrtacanthacridinae

Ornithacris Uvarov, 1924b, p. 9

Espèce-type : *Gryllus Locusta cyaneus* Stoll, 1813, p. 31

Syn.: *Glaphyra* Uvarov, 1923a, p. 144 (n. praeoc) [Uvarov, 1924b, p. 9, avec *Ornithacris*, nom. nov.]

Le genre *Ornithacris*, afrotropical, est resté longtemps confus. Uvarov (1924b, 1942a) ne reconnaissait qu'une espèce, *O. cyanea*, avec plusieurs sous-espèces. Rehn (1943) reconnaissait de son côté à la même période quatre espèces : *O. turbida* (avec *O. t. turbida* et *O. t. cavroisi*), *O. cyanea* (avec deux sous-espèces), *O. orientalis* et *O. pictula* (avec trois sous-espèces dont *O. p. magnifica*). Par la suite, le statut de diverses espèces ou sous-espèces a fluctué selon les auteurs.

Nous avons adopté ici les conclusions de la dernière révision (Mungai, 1987b) qui reconnaît quatre espèces, dont trois en Afrique de l'Ouest, et qui rend diverses signalisations antérieures imprécises. Nous les avons regroupées sous l'appellation *Ornithacris sp.*

Par ailleurs, certaines citations, quoique référées à *O. turbida* ou *O. cavroisi*, paraissent douteuses par rapport à ce que l'on connaît de leur abondance relative et de leur répartition.

⊃ ***Ornithacris cavroisi*** (Finot, 1907)

Acridium cavroisi Finot, 1907, p. 272-274, 346

Holotype femelle, Sénégal, Diaoudaoun (près de Saint-Louis), MNHN Paris

Syn.: *Acridium cyaneum* var. *tereticolle* I. Bolívar, 1908c, p. 110. Holotype femelle, Guinée-Bissau, NHM Londres

[Uvarov, 1924b, p. 13, avec *Ornithacris cyanea cavroisi*]

Cit.: *Acridium cavroisi*

Finot, 1907, p. 272-274, 346

Cyrtacanthacris cavroisi

Kirby, 1910, p. 449

Ornithacris cavroisi

Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Mungai, 1987b, p.155, 158-161 • Popov, 1989, p. 80-81 • Roy, 2003, p. 352, 380, 387 • Steedman, 1990, p. 128, pl. 2

Ornithacris cyanea cavroisi

Chopard, 1941 p. 48 ~ 1950, p. 143 ~ 1958c, p. 12 • Golding, 1948, p. 563, 578-584 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Medler, 1980, p. 40 • Risbec, 1950a, p. 120 ~ 1950b, p. 317 • Saraiva, 1961, p. 133, 151 • Uvarov, 1924b, p. 10, 11, 13 ~ 1926a, p. 445 ~ 1942a, p. 136, 140

Ornithacris cyanea tereticollis

Golding, 1934a, p. 278-282, 292 • Mallamaire, 1948, p. 632

Ornithacris turbida cavroisi ou forme *cavroisi*

Cornes & Riley, 1972, p. 11 • Davey *et al.*, 1959a, p. 96-98 • Descamps, 1965a, p. 960, 961 ~ 1965b, p. 1309 ~ 1968, p. 558, 559-560, forme *cavroisi* • Dirsh, 1964, p. 66 • Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207, 212 ~ 1984, p. 41 • Fishpool & Popov,