

• Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Togo** (Dirsh, 1964 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **AO** (Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b)

L'espèce a été également citée du Soudan, Zaïre, Angola, Zambie, Tanzanie et Afrique du Sud.

PHYLLOCERCUS Uvarov, 1941

Eyprepocnemidinae

Phyllocercus Uvarov, 1941a, p. 68

Espèce-type : *Phyllocercus bicoloripes* Uvarov, 1941a, p. 68-69

Genre afrotropical monospécifique.

□ **Phyllocercus bicoloripes** Uvarov, 1941

Phyllocercus bicoloripes Uvarov, 1941a, p. 68-69, fig. 30, 31 (p. 66)

Holotype mâle, Mali, Diafarabé, NHM Londres

Cit.: *Phyllocercus bicoloripes*

COPR, 1982, p. 260 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh et al., 1978, p. 476-477 • Davey, 1959, p. 127 • Davey et al., 1959a, p. 103 • Descamps, 1953, p. 602, 603, 605, 608 ~ 1954, p. 179 ~ 1965a, p. 951, 952 ~ 1965b, p. 1309 ~ 1968, p. 549, 553 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 112 • Dirsh, 1956c, p. 277, pl. 40 ~ 1965, p. 299 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 340 • Golding, 1948, p. 576-577, 578-584 • Johnston, 1956, p. 411 ~ 1968, p. 220 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 243 ~ 1980a, p. 55-56 ~ 1980b, p. 551, 553 ~ 1984 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 126-127 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Mestre et al., 2001, p. 315 • Otte, 1995a, p. 201 • Popov, 1985c, p. 50-51 • Uvarov, 1941a, p. 66, 68-69



Dist.: **Bénin** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh et al., 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - **Ghana** (Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey et al., 1959a • Descamps, 1965a,b • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1941a • mat. exam.) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1941a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953, 1954 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Tchad** (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **AO** (COPR, 1982 • Mallamaire, 1948 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1985c)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

PHYMATEUS Thunberg, 1815

Pyrgomorphinae

Phymateus Thunberg, 1815b, p. 214, 216-217

Espèce-type : *Gryllus Locusta morbillosus* Linné, 1758, p. 431 [Chenu, 1859, p. 76, et CINZ, 1971, p. 88, 89]

Genre afrotropical, incluant Madagascar, d'environ une douzaine d'espèces. Dirsh (1958c) avait mis *Maphyteus* I. Bolívar, 1904, en synonymie avec *Phymateus*, mais Kevan (1977) le conserve comme sous-genre valide.

□ **Phymateus cinctus** (Fabricius, 1793)

Gryllus cinctus Fabricius, 1793, p. 50-51

Holotype femelle, Sénégal, perdu selon Kevan (1977). Néotype (= holotype ou néotype de *Gryllus Locusta squarrosus* Stoll, 1813, non Linné, 1771), NNM Leyde, indiqué (ou désigné ?) par Kevan (1977, p. 249, 250)

Selon Kevan (1977), seul *P. cinctus* est présent en Afrique de l'Ouest. Les diverses citations d'espèces de *Phymateus* qui ont été faites sont donc ici toutes rapportées à cette espèce.

Syn.: *Phymateus stollii* Saussure, 1861, p. 478 (nom. nov. pour *Gryllus Locusta squarrosus* Stoll, 1813, nom. praeoc.)

[Kevan, 1962b, p. 134, avec *Phymateus cinctus*]

Phymateus flavus I. Bolívar, 1903a, p. 190. Lectotype mâle (Kevan, 1977), Sierra Leone, MNCN Madrid

[Kirby, 1910, p. 314, avec *Phymateus cinctus*]

La citation de *Gryllus Bulla afer* Gmelin en Sierra Leone comme synonyme de *Phymateus mobillosus*, faite par Johnston (1956), est une erreur selon Kevan (1977, p. 259), *G. B. afer* étant en fait synonyme de *Acrydium morbillosum* Fabricius (Tetrigidae).

Cit.: *Gryllus cinctus*

Fabricius, 1793, p. 50-51

Phymateus aegrotus (Err. dét., espèce d'Afrique orientale)

I. Bolívar, 1889b, p. 151 • Dirsh, 1965, p. 117 • Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207, 208 ~ 1984, p. 41 • Jago, 1968, p. 219 •

Johnston, 1956, p. 147 ~ 1968, p. 82 • Karny, 1907, p. 294 • Karsch, 1888c, p. 356 • Saraiva, 1961, p. 120

Phymateus cinctus

COPR, 1982, p. 47 (clé), 53-54 • Cornes & Riley, 1972, p. 6 • Descamps, 1965a, p. 936, 937 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 107 • Dirsh, 1965, p. 117 • Fishpool & Popov, 1984, p. 386 • Gillon, 1974a, p. 131 ~ 1974b, p. 455-456, 520-521, 523 • Jago, 1967b, p. 242 ~ 1968, p. 218-219 • Johnsen, 1981b, p. 152 • Johnston, 1956, p. 148 ~ 1968, p. 83 • Kevan, 1977, p. 249-252 • Kevan & Roy, 1971 • Kirby, 1910, p. 314 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Lecoq, 1977, p. 4 ~ 1980b, p. 535, 537 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 46, 60 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 60-61 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 310 • Otte, 1994b, p. 88 • Oyidi, 1976, p. 83, 91 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 320 • Roy, 1969a, p. 196-207, 208, 221-232 ~ 2003, p. 317, 379, 385

Phymateus (Phymateus) cinctus

Kevan, 1977, p. 249-252

Phymateus flavus

I. Bolívar, 1903a, p. 190-191 • Dirsh, 1965, p. 117 • Johnston, 1956, p. 148

Phymateus karschi

Dirsh, 1964, p. 50 ~ 1965, p. 117 • Golding, 1940b, p. 130 (*karachi!*) ~ 1946, p. 17, 34 ~ 1948, p. 549-550, 578-584 • Jago, 1968, p. 219

Phymateus stollii (ou -ii)


I. Bolívar, 1904c, p. 406, 412 • Chopard, 1958a, p. 142 • Dirsh, 1963b, p. 208 ~ 1965, p. 117 • Johnston, 1956, p. 153 ~ 1968, p. 85 • Karsch, 1893, p. 82

Phymateus viridipes

Chapman, 1961, p. 263, 269 ~ 1962, p. 16, 60 • Cornes & Riley, 1972, p. 6 • Dirsh, 1965, p. 117 • Forsyth, 1966, p. 96 • Golding, 1948, p. 550 • Jago, 1968, p. 219 • Johnston, 1956, p. 154-155 ~ 1968, p. 85-86 • Phipps, 1970, 321 • Zacher, 1913, p. 228

Poekilocera squarrosa (Err. dét. selon Saussure, 1861, p. 478, pour *P. stollii*)

Burmeister, 1838, p. 622



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Burkina Faso** (Lecoq, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - ? **Cap-Vert** (I. Bolívar, 1889b • Jago, 1968 • Saraiva, 1961) - **Côte d'Ivoire** (Gillon, 1974a,b • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Gambie** (Dirsh, 1964 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1965 • Forsyth, 1966 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Karsch, 1888c • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • mat. exam.) - **Mali** (Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965 • Golding, 1940b, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978) - "Sénégal" (Burmeister, 1838 • Dirsh, 1965) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Fabricius, 1793 • Kevan, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a • mat. exam.) - **Sierra Leone** (I. Bolívar, 1903a, 1904c • Dirsh, 1964, 1965 • Kevan, 1962 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Tchad** (Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (I. Bolívar, 1904c • Dirsh, 1965 • Karsch, 1893 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **AO** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Kevan, 1977 • Lecoq, 1980b)

La signalisation des îles du Cap-Vert attribuée à Bolívar (1889b) est une erreur selon Kevan (1977) pour la presqu'île du Cap-Vert au Sénégal (voir note 1, p. 36). *P. cinctus* est signalée vers l'est jusqu'à la frontière Ouganda-Kenya.