



Cette espèce brachyptère et forestière n'est signalée jusqu'ici que du Ghana.

PTEROTILTUS Karsch, 1893

Oxyinae

Pterotiltus Karsch, 1893, p. 108

Espèce-type : *Pygostolus impennis* Karsch, 1891, p. 193-194

Syn.: *Pygostolus* Karsch, 1891, p. 192 (nom. praeoc) [Karsch, 1893, p. 108, avec *Pterotiltus*, nom. nov.]

Genre afrotropical d'une dizaine d'espèces à élytres vestigiaux, connues des forêts du Sud-Cameroun, Congo et Ouest-Zaïre.

⊃ *Pterotiltus inuncatus* (Karsch, 1892) (? , présence à confirmer)

Pygostolus inuncatus Karsch, 1892, p. 72-73

Syntypes mâles, femelle, Cameroun, Buea, MNHU Berlin (DORSA : 6 syntypes mâles)

Cit.: *Pterotiltus inuncatus*

Johnston, 1956, p. 259 ~ 1968, p. 173 • Kirby, 1910, p. 387 • Medler, 1980, p. 41

Dist.: ? Nigeria (Medler, 1980)

Hormis cette signalisation, l'espèce n'a été signalée que de la partie ouest du Cameroun (Mont Cameroun, Buea, Mont Etinde), et donc à proximité du Nigeria. Medler ne précise pas de localité pour ce dernier pays et sa signalisation doit être confirmée. Elle n'est pas à exclure même si les localités recensées du Cameroun sont situées à une certaine altitude (800 à 1500 m).

⊃ *Pterotiltus miniatulus* Karsch, 1893

Pterotiltus miniatulus Karsch, 1893, p. 108-109

Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 6 syntypes, 4 mâles et 2 femelles)

Cit.: *Pterotiltus miniatulus*

Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Dirsh, 1956c, p. 276, pl. 38 ~ 1965, p. 235, 236 • Hollis, 1975, p. 226-227 • Jago, 1967b, p. 241 ~ 1968, p. 246-247 • Karsch, 1893, p. 108-109 • Kirby, 1910, p. 387 • Johnston, 1956, p. 259-260 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 131 • Ramme, 1929, p. 312



Dist.: Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette espèce est également signalée de Guinée Équatoriale.

PYCNODELLA Descamps, 1965

Oedipodinae

Pycnodella Descamps, 1965, p. 1278-1279

Espèce-type : *Pycnodella pictula* Descamps, 1965, p. 1279


Genre afrotropical monospécifique.

u ***Pycnodella pictula*** Descamps, 1965

Pycnodella pictula Descamps, 1965b, p. 1279-1281, fig. 48a, 49-53
Holotype mâle, Mali, Loutana, MNHN Paris

Cit.: *Pycnodella pictula*

Descamps, 1965b, p. 1260, 1278-1281 • Johnston, 1968, p. 335 • Lecoq, 1980b, p. 571, 575 • Mestre, 1988, p. 226-227 •
Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 436



Dist.: **Mali** (Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1980b)

Les spécimens de Descamps sont pour l'instant les seules signalisations de l'espèce.

PYCNODICTYA Stål, 1873

Oedipodinae

Pycnodictya Stål, 1873b, p. 116 (clé), 121

Espèce-type : *Gryllus Locusta obscurus* Linné, 1758, p. 433 [Kirby, 1910, p. 223]

Genre afrotropical d'une douzaine d'espèces. Il nécessite une révision.

u ***Pycnodictya citripennis*** Saussure, 1888

Pycnodictya citripennis Saussure, 1888, p. 167-168


Type femelle, Sierra Leone, MIZ Varsovie (et non au Muséum de Stettin) (2 femelles Sierra Leone, probablement syntypes mais non sûr ; peut-être un seul spécimen examiné par Saussure)

Cit.: *Pycnodictya citripennis*

Chapman, 1962, p. 40 • Chopard, 1958a, p. 143 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1278 • Dirsh, 1965, p. 477, 478 • Fishpool & Popov, 1984, p. 404 • Jago, 1967b, p. 254 ~ 1968, p. 297-298 • Johnston, 1956, p. 548-549 ~ 1968, p. 336 • Kirby, 1910, p. 223 • Lecoq, 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 570, 575 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 220 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Mestre *et al.*, 2001, p. 323 • Otte, 1995b, p. 436 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 340 • Ramme, 1929, p. 277, 278, 484 • Roy, 2003, p. 372, 381, 388 • Saussure, 1888, p. 167-168

Pycnodictya galinieri (Err. dét. pour *P. citripennis* selon Jago, 1968, p. 298)

Jago, 1962, p. 148 • Johnston, 1968, p. 336



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1962, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Mali** (Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Ramme, 1929 • Saussure, 1888) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

L'espèce a été également citée du Zaïre et d'Éthiopie, mais ces signalisations doivent être confirmées.

u ***Pycnodictya diluta*** Ramme, 1929

Pycnodictya diluta Ramme, 1929, p. 278, pl. 4 : f. 3

Holotype mâle, Ghana, Kete Kratje (= *Keti Krachi*), MNHU Berlin (DORSA : + 6 paratypes femelles)