

Le matériel-type est pour l'instant le seul signalé pour cette espèce forestière.

**TANITA** I. Bolívar, 1904

Pyrgomorphinae

*Tanita* I. Bolívar, 1904, p. 446

Espèce-type : *Pyrgomorpha breviceps* I. Bolívar, 1882, p. 109 [Kirby, 1910, p. 323]

Syn.: *Protagasta* I. Bolívar, 1908c, p. 91-92 [Kevan, 1962c, p. 135, avec *Tanita*]

Genre afrotropical comprenant une dizaine d'espèces.

⊂ *Tanita parva violacea* Kevan, 1962

*Tanita parva violacea* Kevan, 1962c, p. 150, fig. 38-39 (p. 149)

Holotype femelle, allotype mâle, Nord-Ouganda, Lira (Torit rd.), NHM Londres

Cit.: *Tanita breviceps*

Gillon, 1971 ~ 1974a, p. 131-132, 169-170 ~ 1974b, p. 458, 521, 523

*Tanita parva*

Delarze & Le Gall, 1989, p. 277, 279 • Descamps, 1965a, p. 937-938, *subsp.* ? • Dirsh, 1965, p. 140 • Duviard, 1970a, p.69

• Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1983, p. 301 • Johnston, 1968, p. 120 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 535, 538 • Le Gall &


Mestre, 1986, p. 46, 57-58, 60 • Roy, 1969a, p. 196-207, 209, 221-232

*Tanita parva violacea*

Cornes & Riley, 1972, p. 6 • Fishpool & Popov, 1984, p. 387 • Jago, 1967b, p. 243 ~ 1968, p. 229 • Kevan, 1977, p. 441 •

Medler, 1980, p.36 • Mestre, 1988, p. 56-57 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 311 • Otte, 1994b, p.

125



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Duviard, 1970a • Gillon, 1971, 1974a,b, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Jago, 1968 • Medler, 1980) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - Togo (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Kevan, 1977 • Lecoq, 1978b, 1980b)

Curieusement, hormis les types d'Afrique de l'Est, ce sont les seules signalisations de cette sous-espèce.

**TAPHRONOTA** Stål, 1873

Pyrgomorphinae

*Taphronota* Stål, 1873a, p. 51

Espèce-type : *Poecilocerus porosus* Stål, 1855, p. 352 [= *Taphronota calliparea* (Schaum)]

Syn.: *Epamontor* Kirby, 1902a, p. 87 [I. Bolívar, 1904a, p. 396, avec *Taphronota*]

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 213, avec *T. (Epamontor)*]

*Pyrgophyma* Giglio-Tos, 1907a, p. 2 [I. Bolívar, 1909a, p. 15, avec *Taphronota*]

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 213, avec *T. (Taphronota)*]

Ce genre afrotropical a été longtemps confus et de nombreuses espèces ont été signalées en Afrique de l'Ouest.

Selon la révision de Kevan (1975), seules quatre espèces, toutes liées aux milieux forestiers, sont présentes dans notre zone d'étude. Celui-ci admet comme sous-genres valides *Epamontor* et *Taphronota*, sous-genres non retenus généralement par la plupart des auteurs.

⊔ ***Taphronota cacuminata* Karsch, 1893**

*Taphronota cacuminata* Karsch, 1893, p. 83-84


Type (holotype (selon Kevan, 1975) femelle, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : holotype femelle)

**Cit.:** *Taphronota cacuminata*

Dirsh, 1965, p. 117, 118 • Jago, 1968, p. 223 • Johnston, 1956, p. 139 • Karsch, 1893, p. 83-84 • Kirby, 1910, p. 309 • Mestre, 1988, p. 191 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115, 122 • Otte, 1994b, p. 136

*Taphronota (Epamontor) cacuminata*

Kevan, 1975, p. 86, 91-92, 93, 135, 145 ~ 1977, p. 290 • Medler, 1980, p. 37 • Otte, 1994b, p. 136



**Dist.:** **Ghana** (Kevan, 1975, 1977 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Kevan, 1975, 1977 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Kevan, 1975, 1977 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

⊔ ***Taphronota calliparea dimidiata* I. Bolívar, 1904**

*Taphronota dimidiata* I. Bolívar, 1904c, p. 397

Syntypes mâle (?), femelles, Abyssinie, MNHN Paris. Lectotype femelle désigné par Kevan (1975, p. 123)

**Syn.:** *Taphronota amarantina* I. Bolívar, 1904c, p. 395, 400. Lectotype mâle (Kevan, 1975), Togo, MNCN Madrid

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 216, avec *Taphronota (Taphronota) calliparea dimidiata*]

*Pyrgophyma sabaudum* Giglio-Tos, 1907a, p. 3. Lectotype mâle (Kevan, 1963b), Ouganda, MRSN Turin

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 216, avec *Taphronota (Taphronota) calliparea dimidiata*]

**Cit.:** *Taphronota amarantina*

I. Bolívar, 1904c, p. 395, 400 • Golding, 1940b, p. 130 ~ 1948, p. 548, 578-584 • Johnston, 1956, p. 138

*Taphronota calliparea*

Dirsh, 1956c, p. 273, pl. 21 ~ 1964, p. 50 ~ 1965, p. 117, 118 • Johnston, 1956, p. 139-140 • Phipps, 1971

*Taphronota calliparea dimidiata*

COPR, 1982, p. 57 • Mestre, 1988, p. 62-63, 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115

*Taphronota cincta* (non *Gryllus cinctus* Fabricius, selon Kevan, 1977, p. 297)

Cornes & Riley, 1972, p. 6

*Taphronota dimidiata*

Kirby, 1910, p. 309

*Taphronota occidentalis* (non Karsch, 1892, Err. dét., partie, selon Kevan, 1975, p. 123, pour *T. c. dimidiata*)

I. Bolívar, 1894, p. clxii • Dirsh, 1965, p. 117, 118 (partie) • Golding, 1948, p. 549 • Jago, 1968, p. 223 (partie) • Johnston, 1956, p. 142 (partie) • Karsch, 1893, p. 83

*Taphronota rostrata* (non Saussure, Err. dét. pour *T. c. dimidiata* selon Kevan, 1975, p. 123)


Chopard, 1958a, p. 141

*Taphronota subverrucosa* (non Saussure, Err. dét. pour *T. c. dimidiata* selon Kevan, 1975, p. 123)

Jago, 1967b, p. 243 (clé) ~ 1968, p. 222 • Dirsh, 1965, p. 117-119 • Kevan & Roy, 1971, p. 262-263

*Taphronota (Taphronota) calliparea dimidiata*

Kevan, 1975, p. 89, 122-128, 142, 143, 146 ~ 1977, p. 296-298 • Medler, 1980, p. 37 • Otte, 1994b, p. 137-138 • Roy, 2003, p. 318-319, 379, 385



**Dist.:** Côte d'Ivoire (COPR, 1982 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (COPR, 1982 • Jago, 1967b • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (COPR, 1982 • Kevan, 1975 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Liberia (COPR, 1982 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1940b • Kevan, 1975 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Sénégal (COPR, 1982 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (I. Bolívar, 1894, 1904c • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Karsch, 1893 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Dirsh, 1964 • Kevan, 1977)

Cette sous-espèce est signalée vers l'est jusqu'au Kenya et vers le sud jusqu'au Sud-Zaïre et Nord-Angola.

#### ⊔ *Taphronota ferruginea ferruginea* (Fabricius, 1781)

*Gryllus ferrugineus* Fabricius, 1781, p. 367

Holotype femelle "Africa aequinoctialis", NHM Londres

**Syn.:** *Gryllus Locustae thaelephorus* Stoll, 1813, p. 32. Type femelle, localité ?. Selon Kevan (1975), un spécimen femelle (NNM Leyde) pourrait être l'holotype.

[Schaum, 1862, p. 131, avec *Gryllus ferrugineus*]

[Uvarov, 1925d, p. 281, avec *Taphronota ferruginea*]

*Poecilocera ornata* Burmeister, 1838, p. 624. Holotype mâle, localité ? ("Ostindien", erroné), MLU Halle (DORSA : holotype)


[Kevan, 1962c, p. 119, avec *Taphronota ferruginea*]

*Taphronota gabonica* Karsch, 1888c, p. 358-359. Type femelle (holotype selon Kevan, 1956c et 1975), Cameroun, MNHU Berlin (DORSA : non recensé)

[Kevan, 1956c, p. 973-974, avec *Taphronota ferruginea*]

*Taphronota subverrucosa* Saussure, 1899, p. 645, 646. Holotype mâle, Africa tropicalis, MHN Genève

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 216, avec *Taphronota ferruginea*]



**Cit.:** *Taphronota ferruginea*

I. Bolívar, 1893c, p. 175 • Chapman, 1962, p. 16 • Chopard, 1958a, p. 141 • COPR, 1982, p. 58-59 • Cornes & Riley, 1972, p. 6 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1963b, p. 208 ~ 1965, p. 117, 118 • Gillon, 1974a, p. 131 ~ 1974b, p. 456, 523 • Golding, 1940b, p. 130 ~ 1948, p. 549, 578-584 • Jago, 1967b, p. 242 ~ 1968, p. 222-223 • Johnsen, 1970, p. 127-128 • Johnston, 1956, p. 141 ~ 1968, p. 90 • Kirby, 1910, p. 310 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 46, 60 • Phipps, 1970, p. 321 • Roy, 1969b, p. 53

*Taphronota ferruginea ferruginea*

Mestre, 1988, p. 62-63 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115

*Taphronota (Taphronota) ferruginea ferruginea*


Kevan, 1975, p. 87, 97-102, 136, 145 ~ 1977, p. 300-302 • Medler, 1980, p. 37 • Otte, 1994b, p. 138-140 • Roy, 2003, p. 317-318, 379, 385, fig. 3

*Taphronota subverrucosa*

Saussure, 1899, p. 645, 646

*Taphronota thaelephora* var. *thaelephora* (= *T. ferruginea ferruginea* selon Kevan, 1975, 1977)

I. Bolívar, 1904c, p. 401



**Dist.:** Bénin (COPR, 1982 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (I. Bolívar, 1893c, 1904c • COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1965 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Kevan, 1975 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969b) - Ghana (Chapman, 1962 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Liberia (COPR, 1982 • Johnsen, 1970 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) -

**Nigeria** (I. Bolívar, 1904c • COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1940b, 1948 • Jago, 1968 • Kevan, 1975 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saussure, 1899) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Togo** (Jago, 1968 • Kevan, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette sous-espèce est également signalée du Cameroun, de Centrafrique, du Zaïre, d'Ouganda et du nord de la Tanzanie.


⊂ ***Taphronota merceti*** I. Bolívar, 1904

*Taphronota merceti* I. Bolívar, 1904, p. 398

Holotype mâle, Congo Belge (= Zaïre), Stanley Pool, MNCN Madrid (Kevan, 1975) (indiqué à tort perdu : Dirsh, 1970)

**Syn.:** *Pyrgophyma splendens* Giglio-Tos, 1907b, p. 3. Lectotype femelle (Kevan, 1963b), Congo, MRSN Turin [Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 216, avec *Taphronota (Taphronota) merceti*]  
*Taphronota corallipes* Sjöstedt, 1929a, p. 14, 40. Lectotype femelle (Kevan, 1963b), Congo, NR Stockholm [Kevan, 1956, p. 972, avec *Taphronota splendens*]  
 [Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 216, avec *Taphronota (Taphronota) merceti*]  
*Taphronota nigripes* Sjöstedt, 1929a, p. 14-15, 40. Holotype femelle, Congo, NR Stockholm [Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 216, avec *Taphronota (Taphronota) merceti*]

**Cit.:** *Taphronota merceti*  
 Dirsh, 1965, p. 117, 118 • Kirby, 1910, p. 309 • Mestre, 1988, p. 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115  
*Taphronota (Taphronota) merceti*  
 Kevan, 1975, p. 86, 105-108, 137, 138, 145 ~ 1977, p. 302-303 • Otte, 1994b, p. 140 • Roy, 2003, p. 318, 379, 385  
*Taphronota splendens*  
 Johnston, 1956, p. 90 (citation erronée de la Guinée attribuée à Kevan, 1963b, p. 109)  
*Taphronota* sp. (= *Taphronota merceti* selon Kevan, 1975, p. 105, 108)  
 Dirsh, 1963b, p. 208



**Dist.:** Guinée (Dirsh, 1963b • Kevan, 1975 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003)

L'espèce est également signalée du Cameroun, Zaïre et Nord-Angola.

⊂ ***Taphronota occidentalis*** Karsch, 1892 ( ?, présence à confirmer)

*Taphronota calliparea* var. *occidentalis* Karsch, 1892, p. 70

Syntypes mâle (?), femelles, Cameroun, MNHU Berlin. Lectotype mâle (Kevan (1975) (DORSA : + 1 paralectotype)

**Syn.:** *Taphronota rostrata* Saussure, 1899, p. 644, 645. Lectotype mâle (Kevan, 1975), Cameroun, MHN Genève. [Kevan & Roy, p. 263, avec *Taphronota occidentalis*]

**Cit.:** *Taphronota occidentalis*  
 Jago, 1968, p. 223 (partie selon Kevan, 1975) • Kirby, 1910, p. 310 • Medler, 1980, p. 37

**Dist.:** Nigeria (Jago, 1968 • Medler, 1980)

Kevan (1975) ne cite *T. occidentalis* que du Cameroun, notamment près de la frontière nigériane. Les signalisations du Nigeria (sans précision de localité), à confirmer, seraient donc a priori possibles dans cette région frontalière.

**TENUITARSUS** I. Bolívar, 1904

Pyrgomorphinae

*Tenuitarsus* I. Bolívar, 1904a, p. 90

Espèce-type : *Tenuitarsus revoilii* I. Bolívar, 1904a, p. 90-91 [= *T. angustus*]

Ce genre englobe selon Kevan (1977) trois petites espèces xérophiles et terricoles, deux d'entre elles étant présentes dans les régions sahéennes et sub-désertiques d'Afrique de l'Ouest. Leur séparation spécifique n'est pas évidente, si tant qu'elle soit fondée, et leur répartition respective mérite d'être vérifiée.

⊂ ***Tenuitarsus angustus*** (Blanchard, 1836)

*Ommexecha angustum* Blanchard, 1836, p. 624

Iconotype femelle, illustration dans Savigny (1826), *Description de l'Égypte*, atlas 10, pl. 6 : f. 1. Néotype femelle, Égypte, près du Caire, UMNH Oxford, désigné par Kevan (1953a, p. 41)