

**Dist.:** Mali (Fishpool & Popov, 1984 • Kevan, 1959 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Niger (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Launois-Luong, 1980b • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Dirsh, 1965 • Kevan, 1959, 1977 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973 • Kevan, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Tchad (Descamps, 1968 • Kevan, 1953, 1959 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - AO (Kevan, 1977 • Launois, 1978b • Lecoq, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce terricole est très commune au Niger dans les bandes nord-soudanienne et sahélienne. Elle affectionne les milieux ouverts au sol sableux, notamment les champs de mil, mais n'a été pourtant que tardivement décrite. Curieusement, elle n'a pas été signalée des zones équivalentes du Mali hormis par Fishpool & Popov (1984) pour la partie ouest. Cette espèce est également citée du Soudan.

**THAMITHERICLES** Descamps, 1977

Thericleinae


*Thamithericles* Descamps, 1977, p. 121-124  
Espèce-type : *Thericles quagga* Karsh, 1893, p. 116

Genre afrotropical comprenant une douzaine d'espèces aptères.

⊃ ***Thamithericles quagga*** (Karsch, 1893)

*Thericles quagga* Karsch, 1893, p. 116  
Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckburg. Holotype mâle, NR Stockholm, et allotype, MNHU Berlin, désignés par Descamps (1977, p. 129) (DORSA : paralectotype = allotype femelle, MNHU)

**Cit.:** *Thamithericles quagga*  
Descamps, 1973b, p. 234 ~ 1977, p. 129, 130 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 93  
*Thericles quagga*  
Dirsh, 1965, p. 27 • Jago, 1967b, p. 241 ~ 1968, p. 217 • Johnston, 1956, p. 15 ~ 1968, p. 35 • Karsch, 1893, p. 116 • Kirby, 1910, p. 81



**Dist.:** Togo (Descamps, 1977 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997)  
Jago (1967b, 1968) signale la présence au Ghana comme probable sans cependant l'attester. En dehors de la série-type du Togo, cette espèce est signalée de Centrafrique et du Congo.

**TMETONOTA** Saussure, 1884

Oedipodinae

*Tmetonota* Saussure, 1884, p. 56 (clé), 159  
Espèce-type : *Trilophidia rugosa* Stål, 1873b, p. 132 [Kirby, 1910, p. 245]

Genre afrotropical comprenant sept espèces, principalement d'Afrique australe.

⊃ ***Tmetonota peregrina*** Karny, 1915

*Tmetonota peregrina* Karny, 1915, p. 136-137  
Holotype femelle, Guinée Française, NM Vienne

