

Apoboleus Karsch, 1891, p. 183-184

Espèce-type : *Apoboleus degener* Karsch, 1891

Syn.: *Ptemoblax* Karsch, 1896, p. 311 [Kevan, 1955a, p. 66, avec *Apoboleus*]
Phialosphaera Karsch, 1896, p. 309-310 [Kevan, 1955a, p. 66, avec *Apoboleus*]
Kasaia Ramme, 1929, p. 376-377 [Dirsh, 1952, p. 260, avec *Apoboleus*]

Genre afrotropical comprenant six espèces forestières microptères ou brachyptères. Deux espèces sont signalées dans notre zone d'étude, *A. ludius* Karsch à l'ouest du Bénin (voir notre catalogue 2006) et *A. degener* au Cameroun.

Clé spécifique : Dirsh (1952, partiel, 3 espèces).

***Apoboleus degener* Karsch, 1891**


Apoboleus degener Karsch, 1891, p. 184.

Holotype femelle, Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : holotype).

Citations bibliographiques

Apoboleus degener

- I. Bolívar, 1908c, p. 115
- Dirsh, 1952, p. 261, 262, 263, 264, figs. 6, 8, 9-11
- Johnston, 1956, p. 283 ~ 1968, p. 233
- Karsch, 1891, p. 184 ~ 1892, p. 70
- Kirby, 1910, p. 441
- Otte, 1995a, p. 208
- Ramme, 1929, p. 375-376, 484, pl. 9 : f. 9, 10



Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1965 • I. Bolívar, 1908c • Karsch, 1891, 1892 • Ramme, 1929)

Cette espèce forestière a été également signalée de Guinée Équatoriale (riv. San Benito) par Dirsh (1952, 1965) et Ramme (1929).

Iconographie

Habitus (im. : Ramme, 1929♂♀) - **Autres morph.** (Dirsh, 1952) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1952, 1956c)

Bio-écologie

Aucune information.

