

Atractomorpha Saussure, 1862, p. 474-475

Espèce-type : *Truxalis crenulatus* Fabricius, 1793 [Kirby, 1910, p. 331]

Syn.: *Perena* Walker, 1870a, p. 506 [I. Bolívar, 1905c, p. 196, avec *Atractomorpha*]

Ce genre comprend environ 25 espèces des régions afrotropicale, orientale et australienne. L'année 1861 est fréquemment citée pour la description du genre, mais la date de parution de la partie contenant l'article de Saussure, indiquée par la revue, est janvier 1862.

Quatre espèces seraient présentes dans notre zone d'étude selon Kevan (1977) mais une grande confusion a longtemps régné dans ce genre. On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur les trois autres espèces ouest-africaines à savoir *A. acutipennis gerstaeckeri* I. Bolívar, *A. occidentalis* Kevan & Chen et *A. rufopunctata* I. Bolívar.

La première d'entre elles, à vaste répartition, est connue du Cameroun et présente en République Centrafricaine même si elle n'a pas encore été signalée de ce pays.

Clé spécifique : Kevan & Chen (1969, 16 espèces mondiales dont 5 afrotropicales).

***Atractomorpha aberrans* Karsch, 1888**

Atractomorpha aberrans Karsch, 1888a, p. 333-334.

Holotype femelle, Angola, St. Salvador, MNHU Berlin (DORSA : holotype).

Citations bibliographiques

Atractomorpha aberrans


- Bruner, 1920, p. 104
- I. Bolívar, 1908c, p. 92
- Dirsh, 1965, p. 151, 152 (partie) ~ 1970, p. 66-67
- Johnston, 1956, p. 195 (partie) ~ 1968, p. 123 (partie)
- Karsch, 1888a, p. 333-334 ~ 1891, p. 179
- Kevan, 1977, p. 360-361
- Kevan *et al.*, 1974, p. 245, 247-248, fig. 27
- Kevan & Chen, 1969, p. 148, 152, 154, 162, 165, 166-170, 197, figs. 5, 6, 34, 36, 37, 41, pl. 2 A
- Kirby, 1910, p. 331
- Medler, 1980, p. 36
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 ~ 2006, p. 17, 65
- Otte, 1994b, p. 31
- Sjöstedt, 1910, p. 4 ~ 1931a, p. 19

Atractomorpha rufopunctata (non I. Bolívar, 1894)

- Kevan, 1956b, p. 975 (Err. dét., selon Kevan & Chen, 1969)
- Kirby, 1910, p. 331 (partie, selon Kevan & Chen, 1969)

Truxalis crenulatus (non Fabricius)

- Palisot de Beauvois, 1807, p. 79-80 (partie) pl. 3 : f. 1a (selon Banerjee & Kevan, 1960)



Distribution géographique

Cameroun (I. Bolívar, 1908c • Bruner, 1920 • Karsch, 1891 • Kevan, 1956b • Sjöstedt, 1910) - **Nigeria** (Kevan, 1977 • Kevan & Chen, 1969 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **R. centrafricaine** (Kevan & Chen, 1969) - **AO** (Dirsh, 1965)

Cette espèce est signalée du Gabon, du Congo, de Guinée équatoriale, de la R.D. du Congo (ex-Zaire), d'Angola et de Zambie.

Selon le travail de Kevan & Chen (1969), les diverses signalisations de *A. aberrans* à l'ouest du Nigeria (Ghana, Guinée, Sierra Leone, Togo) sont des erreurs pour *A. occidentalis* ou *A. rufopunctata*.

ATRACTOMORPHA Saussure, 1862 - Pyrgomorphinae

Iconographie

Habitus (im. : Kevan & Chen, 1969♀) - **Autres morph.** (Kevan & Chen, 1969) - **Anat.** (génit. : Kevan, Akbar & Chen, 1974♂ • Kevan & Chen, 1969♂♀)

Bio-écologie

Aucune information.