

Bocagella I. Bolívar, 1889b, p. 161-162Espèce-type : *Bocagella lanuginosa* I. Bolívar, 1889b


Genre afrotropical comprenant trois espèces.

On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur *Bocagella acutipennis* Miller, 1932, la seule autre espèce présente en Afrique de l'Ouest.***Bocagella lanuginosa* I. Bolívar, 1889***Bocagella lanuginosa* I. Bolívar, 1889b, p. 162, pl. 1 : f. 5, 5a.

Holotype femelle, Angola, Caconda, a priori détruit dans l'incendie du Musée de Lisbonne.

Citations bibliographiques*Bocagella lanuginosa*

- I. Bolívar, 1889b, p. 162, pl. 1 : f. 5, 5a
- Kirby, 1910, p. 465
- Dirsh, 1956c, p. 277, pl. 39 : f. 19 ~ 1965, p. 248, 249, fig. 191 ~ 1966, p. 164-165, fig. 73
- Otte, 1995a, p. 132
- Johnston, 1956, p. 278 ~ 1968, p. 182
- Ramme, 1929, p. 343, 482
- Karsch, 1893, p. 93
- Sjöstedt, 1931a, p. 27, 63, pl. 3 : f. 4
- Uvarov, 1977, p. 374, 387, fig. 226b

**Distribution géographique****R. centrafricaine** (Ramme, 1929)

Cette signalisation est à vérifier car Ramme ne connaissait pas *B. acutipennis* dont la description a été faite trois ans plus tard par Miller. Les signalisations du Togo (Karsch, 1893 ; Ramme, 1929) sont rapportées à *B. acutipennis* Miller.

L'espèce est également citée d'Angola et de Tanzanie.

Iconographie

Habitus (im. : Dirsh, 1965♂, 1966♀ • Uvarov, 1977♂) - **Autres morph.** (Dirsh, 1966 • I. Bolívar, 1889b • Sjöstedt, 1931a) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965)

Bio-écologie

Aucune information.