

*Criotocatantops* Jago, 1984, p. 304 (clé), 346  
 Espèce-type : *Catantops annulatus* Uvarov, 1926a

Genre afrotropical comprenant au moins quatre espèces selon Jago (1984). Il nécessite une révision. On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur les deux autres espèces recensées dans notre zone d'étude à savoir *C. annulatus* (Uvarov) et *C. pulchripes* Karny.

**Clé spécifique** : Dirsh (1956a, genre *Catantops* incluant à l'époque 37 espèces afrotropicales et orientales dont celles du genre *Criotocatantops*).

### ***Criotocatantops clathratus* (Ramme, 1929)**

*Catantops clathratus* Ramme, 1929, p. 421-422, fig. 83, pl. 13 : f. 1.  
 Holotype mâle, République centrafricaine, Pama-Quelle, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 5 paratypes).


#### **Citations bibliographiques**

##### *Catantops clathratus*

- Dirsh, 1956a, p. 46-50 (clé espèces), 68-70, 71, figs. 179-190, 197 ~ 1964, p. 60 ~ 1965, p. 363, 364 ~ 1966, p. 281-283, fig. 139 ~ 1970, p. 311-312
- Johnston, 1956, p. 313 ~ 1968, p. 258
- Ramme, 1929, p. 421-422, fig. 83, pl. 13 : f. 1
- Roy, 1968, p. 11

##### *Criotocatantops clathratus*

- Jago, 1984, p. 346 (comb. nov.)
- Otte, 1995a, p. 294



#### **Distribution géographique**

**R. centrafricaine** (Jago, 1984 • Ramme, 1929) - ? **Togo** (Dirsh, 1956a, 1964, 1966, 1970)

Les citations du Togo par Dirsh sont à confirmer (confusion possible notamment avec *C. annulatus*). Dirsh (1956a) ne précise pas de localités mais cartographie grossièrement la répartition ; nous reportons approximativement sur notre carte la zone

concernée. Les citations du Cameroun (matériel type) sont des erreurs pour la République centrafricaine.

L'espèce est également connue du Soudan, d'Ouganda, de R.D. Congo (ex-Zaïre) et d'Angola.

#### **Iconographie**

**Habitus** (im. ♀ : Ramme, 1929) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a • Ramme, 1929) - **Anat.** (?)

#### **Bio-écologie**

Aucune information.

### ***Criotocatantops irritans* (Ramme, 1929)**

*Catantops irritans* Ramme, 1929, p. 425-427, figs. 85b, 86a.  
 Holotype mâle, Cameroun, Satsche, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 20 paratypes).


La synonymie avec *Catantops puchripes* Karny, 1915, faite par Dirsh & Uvarov (1953b, p. 233), est erronée selon Jago (1984, p. 347).

**Citations bibliographiques***Catantops irritans*

- Dirsh, 1956a, p. 66-67 (syn. de *C. puchripes*)
- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233
- Johnston, 1956, p. 320 (syn. de *C. puchripes*)
- Ramme, 1929, p. 425-427, fig. 85b, 86a

*Criotocatantops irritans*

- Jago, 1984, p. 346-347 (comb. nov.)
- Otte, 1995a, p. 294-295

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Jago, 1984 • Ramme, 1929) - **R. centrafricaine** (Ramme, 1929)

L'espèce est également connue du Soudan, d'Ouganda, de R.D. Congo (ex-Zaïre) et d'Angola.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Ramme, 1929) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information.