

Eucoptacra I. Bolívar, 1902b, p. 623, 625 (clé)
Espèce-type : *Acridium (Catantops) praemorsum* Stål, 1860

Syn.: *Coptacroides* I. Bolívar, 1912b, p. 95 [Uvarov, 1953b, p. 47, avec *Eucoptacra*]

Genre comprenant environ vingt-cinq espèces afrotropicales et orientales. Il demeure confus et nécessite une révision.

Cinq espèces sont citées pour l'Afrique de l'Ouest. On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur les quatre autres espèces à savoir *E. anguliflava* (Karsch), *E. basidens* Chapman, *E. bicornis* Baccetti et *E. spathulacauda* Jago, 1966.

Clés spécifiques : Dirsh (1966, ♂ 14 espèces) - Dirsh, (1970, R.D. Congo, ♂ 8 espèces) - Uvarov (1953b, ♂ 16 espèces).

***Eucoptacra signata* (I. Bolívar, 1889)**

Epistaurus signatus I. Bolívar, 1889b, p. 164.

Type femelle, Angola, Caconda, Muséum de Lisbonne, détruit.


Citations bibliographiques

Epistaurus signatus

- Kirby, 1910, p. 471
- Ramme, 1929, p. 356-357, fig. 62

Eucoptacra signata

- Dirsh, 1965, p. 241, 242 ~ 1966, p. 155-156, fig. 1 ~ 1970, p. 127, 128-129
- Johnston, 1956, p. 269 ~ 1968, p. 177
- Otte, 1995a, p. 138
- Uvarov, 1953b, p. 48, 49-50 (clé espèces), 51, fig. 44



Distribution géographique

R. centrafricaine (Ramme, 1929)

Les indications du Cameroun (Johnston, Dirsh) faisant référence à Ramme (1929) sont erronées et se rapportent à la République centrafricaine. L'espèce est également signalée d'Angola, du Congo (Brazzaville), d'Ouganda et de la R.D. Congo (ex-Zaïre).

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965 • Ramme, 1929 • Uvarov, 1953b) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

