

Glauningia Ramme, 1929, p. 333-334
Espèce-type : *Glauningia macrocephala* Ramme, 1929

Genre afrotropical monospécifique.


***Glauningia macrocephala* Ramme, 1929**

Glauningia macrocephala Ramme, 1929, p. 333, 334-335, figs. 50, 51a, pl. 7 : f. 13.
Holotype femelle, Cameroun, Ossidinge, MNHU Berlin (DORSA : holotype).

Citations bibliographiques

Glauningia macrocephala

- Dirsh, 1956c, p. 279, pl. 50 : f. 16 ~ 1965, p. 205, 206, fig. 153
- Golding, 1948, p. 577
- Jago, 1967b, p. 263 (clé) ~ 1968, p. 234
- Johnston, 1956, p. 235
- Medler, 1980, p. 39
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 ~ 2006, p. 18, 148
- Otte, 1995a, p. 91
- Ramme, 1929, p. 333, 334-335, figs. 50, 51a, pl. 7 : f. 13.

**Distribution géographique**

Cameroun (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Ramme, 1929) - **Ghana** (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

Iconographie

Habitus (im.: Dirsh, 1965♂ • Ramme, 1929♀) - **Autres morph.** (Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965)

Bio-écologie

C'est une espèce de la zone forestière, très peu collectée, et il n'y a aucune information précise. Jago (1968) indique "*Feeds on broad-leaved forest herbs along streams, e.g. Afromomum*".

