

*Hintzia* Ramme, 1929, p. 357-358Espèce-type : *Hintzia squamiptera* Ramme, 1929

Genre afrotropical monospécifique. Il a été très souvent orthographié à tort *Hinzia* (voir Dirsh, Otte), apparemment à la suite de Johnston (1956).

Ce genre avait été mis en synonymie avec *Parepistaurus* Karsch par Dirsh (1958c) mais Green (1998) l'a réinstitué valide.

***Hintzia squamiptera* Ramme, 1929***Hintzia squamiptera* Ramme, 1929, p. 357-358, fig. 63, pl. 8 : f. 11.


Holotype femelle, Cameroun, Buea, MNHU Berlin (DORSA : holotype).

**Citations bibliographiques***Hintzia squamiptera*

- Chopard, 1945, p. 177
- Green, 1998, p. 265, 304, 307, 313, 326-328, figs. 155-158, 176, 188, 190-191, 193
- Johnston, 1956, p. 275 (*Hinzia* !)
- Ramme, 1929, p. 357-358, fig. 63, pl. 8 : f. 11

*Parepistaurus squamipterus*

- Dirsh, 1958c, p. 55-56 (*Hinzia* ! synonyme) ~ 1965, p. 243, 244 (*Hinzia* ! Synonyme)
- Jago, 1962, p. 142, 43-144, 147, figs. 10, 13, 33-35
- Johnston, 1968, p. 179 (*Hinzia* ! Synonyme)
- Otte, 1995a, p. 140 (*Hinzia* ! Synonyme)

**Distribution géographique****Cameroun** (Chopard, 1945 • Green, 1998 • Jago, 1962 • Ramme, 1929)

Espèce signalée uniquement de l'Ouest du Cameroun (Mont Cameroun, Mont Koupe, Mont N'Lonako)

**Iconographie**

**Habitus** (im. : Jago, 1962♂ • Ramme, 1929♀) - **Autres morph.** (Green, 1998 • Jago, 1962 • Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂ : Green, 1998 • Jago, 1962)

**Bio-écologie**

Cette espèce microptère n'a été recensée que de quelques localités d'altitude. Jago (1962) l'observe sur les pentes du Mont Cameroun dans des zones broussailleuses au sol tapissé d'herbes basses.