

Mazaea Stål, 1876b, p. 54

Espèce-type : *Mazaea granulosa* Stål, 1876b

Genre afrotropical monospécifique.

La position de ce genre est à préciser. Longtemps inclus dans les Catantopinae, il a été transféré dans la sous-famille très hétérogène des Hemiacridinae par Dirsh (1966). Dans le catalogue de Otte (1995a), il est encore intégré aux Catantopinae.

Mazaea granulosa Stål, 1876

Mazaea granulosa Stål, 1876a, p. 54.

Type femelle, "Africa occidentalis", NR Stockhom.

Synonymes

Mazaea granulosa var. *cingulata* I. Bolívar, 1908c, p. 105. Type, Loagna (Gabon ou Congo ou Angola ?), MHN Genève ?
[Dirsh, 1966, p. 102, avec *Mazaea granulosa*]


Citations bibliographiques

Mazaea granulosa

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - I. Bolívar, 1908c, p. 105 | - Kirby, 1910, p. 386 |
| - Dirsh, 1965, p. 309, 310, fig. 236 ~ 1966, p. 102-103, fig. 41 ~ 1970, p. 79-80, fig. 22 | - Medler, 1980, p. 40 |
| - Johnston, 1956, p. 265 ~ 1968, p. 224 | - Mestre & Chiffaud, 2006, p. 18, 189 |
| - Karsch, 1891, p. 179 | - Otte, 1995a, p. 312 |
| - Kevan, 1956b, p. 969-970, fig. 5 | - Pictet & Saussure, 1887, p. 331 |
| | - Stål, 1876b, p. 54 |

Mazaea granulosa var. *cingulata*

- I. Bolívar, 1908c, p. 105



Distribution géographique

Cameroun (I. Bolívar, 1908c • Karsch, 1891 • Kevan, 1956b • *mat. exam.*) - ? **Nigeria** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Medler, 1980) - **AO** (Pictet & Saussure, 1887 • Stål, 1876b)

Il n'y a pas de précision de localités pour les signalisations du Nigeria, dues à Dirsh et Medler. Il est possible que l'indication de ce pays soit une reprise de Johnston (1956, p. 265) qui faisait référence à Karsch (1891). Il s'agissait d'une erreur car les localités citées par Karsch sont au Cameroun. Mais

une présence au sud-est du Nigeria est cependant tout à fait plausible et même probable.

Cette espèce est également signalée du Congo (= *R.P. Congo*), de Guinée équatoriale et de R.D. Congo (ex-Zaïre).

Iconographie

Habitus (im. ♂ : Dirsh, 1965, 1966, 1970) - **Autres morph.** (Kevan, 1956b) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1965, 1966, 1970)

Bio-écologie

Aucune information. Espèce aptère de la zone forestière.