

Orthochthya Karsch, 1891, p. 177 (note infra-paginale)
Espèce-type : *Chrysochraon dasyncnemis* Gerstäcker, 1869

Syn.: *Cymochthya* Karsch, 1893, p. 54 (clé), 68-69 [Uvarov, 1953b, p. 146, avec *Orthochthya*]
Rasperecta Sjöstedt, 1931b, p. 20-21 [Dirsh, 1958c, p. 60, avec *Orthochthya*]
Macrocymochthya Sjöstedt, 1931b, p. 22 [Kevan, 1956a, p. 30-31, avec *Orthochthya*]

Ce genre afrotropical de 25 espèces a été révisé par Popov & Fishpool (1988, 1992). Nombre de signalisations antérieures sont peu ou pas utilisables tant la confusion a été grande dans ce genre. On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations concernant les autres espèces ou sous-espèces ouest-africaines du genre à savoir *O. ampla* (Sjöstedt), *O. aurea* Popov & Fishpool, *O. brachyncnemis brachynemesis* Karsch, *O. dasyncnemis bisulcata* (Krauss), *O. nigricornis nigricornis* (Karsch), *O. pulchripes* Popov & Fishpool, *O. sudanica* Popov & Fishpool et *O. venosa* Ramme, 1929.


Clé spécifique : Popov & Fishpool (1992, 25 espèces et 11 sous-espèces).

***Orthochthya brachyncnemis ottei* Popov & Fishpool, 1992**

Orthochthya brachyncnemis ottei Popov & Fishpool, 1992, p. 69, 71, 73-74, figs. 21E,M.
Holotype mâle, République centrafricaine, Oka (Ouaka), Middle Congo, ANS Philadelphie ? (non recensé sur site Internet ANSP 2009).

Citations bibliographiques

Orthochthya brachyncnemis ottei
Popov & Fishpool, 1992, p. 69, 71, 73-74, figs. 21E,M.



Distribution géographique

R. centrafricaine (Popov & Fishpool, 1992)

La localité type étant ambiguë (plusieurs possibilités), nous reprenons approximativement la localisation cartographiée par Popov & Fishpool. Cette sous-espèce n'est signalée que par le matériel type.

Iconographie

Habitus (im. ♂ : Karsch, 1893) - **Autres morph.** (Popov & Fishpool, 1992) - **Anat.** (génit. ♂ : Popov & Fishpool, 1992)

Bio-écologie

Aucune information.

***Orthochthya nigricornis congoensis* (Sjöstedt, 1931)**

Cymochthya congoensis Sjöstedt, 1931a, p. 12.
Syntypes mâles, femelles, Congo, NR Stockholm. Lectotype mâle désigné par Popov & Fishpool (1992).

Synonymes

Cymochtha congoensis Sjöstedt, 1931a

[Popov & Fishpool, 1992, p. 36, avec *O. nigricornis congoensis*, stat. nov.]

Citations bibliographiques

Cymochtha congoensis

- Dirsh, 1970, p. 438 (synonymie incorrecte avec *O. bisulcata*)

- Sjöstedt, 1931a, p. 12 (par err. *Cymochta*) ~ 1932, p. 14, 86, pl. 2 : f. 2a, 2b

Orthochtha congoensis


- Dirsh, 1965, p. 433, 434

- Johnston, 1956, p. 629

Orthochtha nigricornis congoensis

- Otte, 1995b, p. 292

- Popov & Fishpool, 1992 (stat. nov.), p. 9, 14 (carte), 27-28 (clé), 30, 31, 32, 34, 36-37, 142-143, figs. 3, 8C,D, 9L, 10S



Distribution géographique

Cameroun (Popov & Fishpool, 1992)

Cette sous-espèce est également signalée du Congo et d'Angola.

Iconographie

Habitus (im. ♂♀ : Sjöstedt, 1932) - **Autres morph.** (Popov & Fishpool, 1992) - **Anat.** (génit. ♂ : Popov & Fishpool, 1992)

Bio-écologie

Aucune information.