

*Parapropacris* Ramme, 1929, p. 402

Espèce-type : *Stenocrobylus rhodopterus* Uvarov, 1923

**Syn.:** *Anacatantops* Dirsh, 1953, p. 232 [Jago, 1984, p. 351, avec *Parapropacris*]

Genre afrotropical comprenant quatre espèces selon Jago (1984). On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur l'autre espèce présente dans notre zone d'étude à savoir *P. notata* Karsch.

### *Parapropacris ebneri* (Ramme, 1929)

*Anthermus ebneri* Ramme, 1929, p. 455-456, fig. 94, pl. 14 : f. 6.

Holotype femelle, République Centrafricaine, Pama-Quelle, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 4 paratypes).

#### Synonymes

*Anthermus ebneri elongatus* Ramme, 1929, p. 456-457, pl. 15 : f. 7. Holotype femelle, Zaïre, MRAC Tervuren [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anthermus ebneri*] [Dirsh, 1956a, p. 27, *Anthermus ebneri*]


#### Citations bibliographiques

*Anthermus ebneri*

- Dirsh, 1956a, p. 26-27 ~ 1965, p. 356, 357 ~ 1966, p. 245 ~ 1970, p. 281-282
- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232
- Johnston, 1956, p. 333 ~ 1968, p. 248
- Ramme, 1929, p. 455-456, fig. 94, pl. 14 : f. 6 ~ 1931a, p. 940-941, fig. 14
- Sjöstedt, 1931a, p. 24, 63, pl. 3 : f. 1, 1a, 1b, 2
- Uvarov, 1953b, p. 34, 35, fig. 25

*Anthermus ebneri elongatus*

- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232 (comme syn. de *A. ebneri*)
  - Ramme, 1929, p. 456-457, pl. 15 : f. 7
- Parapropacris ebneri*
- Jago, 1984, p. 351
  - Otte, 1995a, p. 324



#### Distribution géographique

? Cameroun ou Nigeria (Ramme, 1929) - R. centrafricaine (Ramme, 1929)

La localisation très vague indiquée par Ramme (1929) est " *Dampferfahrt* (trajet en bateau à vapeur) *Niger-Benuë*". La pénétration occidentale du nord Cameroun s'est faite jusqu'au tout début du 20ème siècle en partie depuis la côte nigériane en remontant le Niger puis la Bénoué jusqu'à Garoua ; l'indication est donc très imprécise.

L'étiquette du spécimen conservé à Berlin (rec. Houy) précise également " *Neu-Kamerun*". La région de Garoua, et notamment la partie camerounaise de la Bénoué, faisait en fait partie du Kamerun allemand et

non du Neu-Kamerun (= en grande partie une bande occidentale de la R. centrafricaine plus une petite portion du sud-ouest du Tchad).

Le Dr. Houy participait à une mission de délimitation de frontière entre Neu-Kamerun et Congo français de l'époque (incluant en particulier la R. centrafricaine) ; tout ou partie de ses collectes s'est peut-être vu attribuer cette origine générale.

L'espèce est également signalée du Congo, d'Angola, de R.D. Congo (ex-Zaïre) et de Zambie.

#### Iconographie

**Habitus** (im. : Ramme, 1929♀, sous *A. ebneri* et *A. ebneri elongatus* • Sjöstedt, 1931a♂♀) - **Autres morph.** (Jago, 1994 • Ramme, 1929, 1931a • Sjöstedt, 1931a • Uvarov, 1953b) - **Anat.** (?)

---

***PARAPROPACRIS*** Ramme, 1929 - Catantopinae

---

**Bio-écologie**

Aucune information.