

Phymeurus Giglio-Tos, 1907b, p. 27-28

Espèce-type : *Phymeurus pardalis* Giglio-Tos, 1907b, p. 28

Syn.: *Platyphymus* Uvarov, 1922c, p. 119, 146-147 [Uvarov, 1954a, p. 146, avec *Phymeurus*]

Genre afrotropical de près d'une vingtaine d'espèces dont trois recensées dans notre zone d'étude. On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur les deux autres espèces, endémiques inféodées aux milieux d'altitude de la dorsale guinéenne, à savoir *P. lomaensis* Roy et *P. nimbaensis* (Chopard).

Clé spécifique : Dirsh (1966 et 1970, ♂ 18 espèces) - Mason (1966, 18 espèces).

***Phymeurus reductus* (Ramme, 1929)**

Amblyphymus reductus Ramme, 1929, p. 468-469, fig. 102, pl. 15 : f. 8.

Holotype mâle, République centrafricaine, Bosum, Uamgebiet, NHM Londres.

Citations bibliographiques

Amblyphymus reductus


- Ramme, 1929, p. 468-469, fig. 102, pl. 15 : f. 8

Phymeurus reductus

- Dirsh, 1965, p. 264-265, 266 ~ 1966, p. 179-181 (clé espèces) ~ 1970, p. 177-179 (clé espèces)

- Mason, 1966, p. 396, 401, 402, 446-448, 454, figs. 2.7, 19, 23

- Otte, p. 171



Distribution géographique

R. centrafricaine (Dirsh, 1965 • Mason, 1966 • Ramme, 1929).

La signalisation du Cameroun faite par Dirsh se réfère très certainement au matériel type de Ramme, aucun autre pays n'étant cité pour la répartition. Le pointage cartographique de la localité type fait par Mason (1966), au sud-est du Cameroun est par ailleurs erroné.

Iconographie

Habitus (im. : Ramme, 1929♂) - **Autres morph.** (Mason, 1966 • Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂ : Mason, 1966)

Bio-écologie

Aucune information.

