

Sumba I. Bolívar, 1909b, p. 288, 289
Espèce-type : *Sumba roseipennis* I. Bolívar, 1912b

Genre afrotropical comprenant six espèces.

Sumba longicornis Ramme, 1929

Sumba longicornis Ramme, 1929, p. 275, pl. 3 : f. 25, 26.
Holotype mâle, République centrafricaine, Bosum, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 11 paratypes R, centrafricaine et Togo).


Citations bibliographiques

Sumba longicornis

- Dirsh, 1965, p. 422, 423
- Fishpool & Popov, 1984, p. [400]
- Jago, 1968, p. 314-315
- Johnsen, 1971, p. 40-42, pl. 12 : f. 1-6
- Johnston, 1956, p. 616
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 ~ 2006, p. 21, 278
- Otte, 1995b, p. 305
- Ramme, 1929, p. 275, pl. 3 : f. 25, 26

Sumba sp. (identification que nous effectuons sous réserve, *S. longicornis* étant la seule espèce ouest-africaine)

- Delarze & Le Gall, 1989, p. 279, 280



Distribution géographique

? Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - R. centrafricaine (Dirsh, 1965 • Ramme, 1929) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Les citations du Cameroun (en fait le Neu-Kamerun allemand) en référence au matériel type de Ramme sont des erreurs pour la République centrafricaine.

Le Togo et la Côte d'Ivoire, s'il s'agit bien de la même espèce, sont les deux seuls autres pays d'où est citée

cette espèce. On doit donc s'attendre à la retrouver au moins dans les savanes préforestières ou soudaniennes du Bénin au Cameroun.

L'espèce est par ailleurs signalée d'Ouganda.

Iconographie

Habitus (im. : Ramme, 1929♂♀) - **Autres morph.** (Johnsen, 1971) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information précise.

Fishpool & Popov (1984), au Togo, l'observent dans les prairies de plateaux.

