

Digentia Stål, 1878, p. 47 (clé genres)

Espèce-type : *Oxya punctatissima* Stål, 1875, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical comprenant quatre espèces.

Syn. *Genditia* Bolívar, 1911, p. 301 [Hollis, 1975, p. 223, avec *Digentia*]

***Digentia fasciata* Ramme, 1929**

Digentia fasciata Ramme, 1929, p. 322, 323-324, figs. 40, 41b.

Holotype mâle, Cameroun, Lolodorf, MNHU Berlin (DORSA : holotype et allotype).

Citations bibliographiques

Digentia fasciata

- Dirsh, 1965, p. 236, 237, fig. 180a
- Hollis, 1975, p. 224
- Johnston, 1956, p. 256 ~ 1968, p. 174
- Kevan, 1956b, p. 963
- Otte, 1995a, p. 129
- Ramme, 1929, p. 322, 323-324, figs. 40, 41b



Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1965 • Kevan, 1956b • Ramme, 1929 • *mat. exam.*)

L'espèce est également signalée du Congo.

Iconographie

Habitus (*im.* : Dirsh, 1965 ♀) - **Autres morph.** (Ramme, 1929) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information. Espèce forestière.

***Digentia punctatissima* (Stål, 1875)**

Oxya punctatissima Stål, 1875, p. 33.

Holotype mâle (en alcool puis épinglé), "Africa occidentalis", NR Stockholm.

Citations bibliographiques

Digentia punctatissima

- Bolívar, 1905b, p. 229 ~ 1918a, p. 23
- Dirsh, 1965, p. 236, 237, fig. 180b,c ~ 1970, p. 121, fig. 37
- Hollis, 1975, p. 215, 223
- Jago, 1968, p. 245
- Johnston, 1956, p. 256-257 ~ 1968, p. 174
- Kirby, 1910, p. 395

Digentia punctatissima

- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 ~ 2006, p. 18, 122
- Otte, 1995a, p. 129
- Ramme, 1929, p. 321, 322-323, 485, figs. 39, 41a

Oxya punctatissima

- Stål, 1875, p. 33

Distribution géographique

Bioko (Bolívar, 1905b • Dirsh, 1965 • Jago, 1968) - **Cameroun** (*mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1965)

Hormis l'holotype d'origine géographique imprécise, cette espèce n'était citée que de R.D. Congo et de Guinée Équatoriale (partie continentale et île de Fernando Poo, aujourd'hui Bioko ou Bioko). Sa présence au sud du Cameroun était donc certaine. Nous rapportons à cette espèce un mâle de notre collection.



La signalisation du Togo (Karsch, 1893) correspond en fait à *Pododula ancisa* décrite 3 ans plus tard par le même Karsch (1896).

Bio-écologie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965, 1970 • Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂ : Hollis, 1975)

Bio-écologie

Aucune information. Espèce forestière.