

*Duviardia* Donskoff, 1986, p. 203-204

Espèce-type : *Duviardia oubitai* Donskoff, 1986, par désignation originale et monotypie

Ce genre inclut deux espèces microptères citées seulement de la zone forestière du sud de la Côte d'Ivoire.

**Clé** Aucune. On se reportera à Grunshaw (1990a) qui précise et illustre certains caractères distinctifs.

### ***Duviardia fishpooli* Grunshaw, 1990**

*Duviardia fishpooli* Grunshaw, 1990a, p. 113-117, figs. 1-14

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, NHM Londres

#### **Citations bibliographiques**

*Duviardia fishpooli*

- Grunshaw, 1990a, p. 113-116, figs. 1-8
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 ~ 2006, p. 20, 126, 1 carte

#### **Distribution géographique**

**Côte d'Ivoire** (Grunshaw, 1990a • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*)

Ce sont les seules signalisations.

#### **Iconographie**

**Habitus** (*im.*: Grunshaw, 1990a) - **Autres morph.** (Grunshaw, 1990a) - **Anat.** (génit. ♂♀ : Grunshaw, 1990a.)



#### **Bio-écologie**

Aucune information détaillée.

Grunshaw fournit quelques indications provenant de Fishpool, collecteur du matériel type. Ce dernier indique qu'il s'agit d'une espèce vivant à terre en forêt à canopée close, fréquemment associée à des espèces comme *Apoboleus ludius*, *Serpusia catamita* ou *Holopercna gerstaeckeri*. Elle est observée soit sur le sol soit, souvent, sur ou près de *Calculus striolata*

(Araceae) sans qu'il soit possible de préciser s'il y a un lien alimentaire particulier avec cette plante.

Grunshaw pense qu'il s'agit d'une espèce à l'origine liée à la forêt primaire mais capable de tolérer une certaine dégradation du milieu expliquant sa présence dans certaines forêts secondaires.

Nous l'avons personnellement collectée sur la végétation basse en sous-bois de ce type de forêt.

### ***Duviardia oubitai* Donskoff, 1986**

*Duviardia oubitai*

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Forêt de Taï, MNHN Paris

Donskoff, 1986, p. 204-206, figs. 1-16

#### **Citations bibliographiques**

*Duviardia oubitai*

- Couturier *et al.*, 1984, p. 156, 167-168, 170, fig. 18
- Donskoff, 1986, p. 204-206, figs. 1-16
- Grunshaw, 1990a, p. 113-115, figs. 9-14
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 ~ 2006, p. 20, 126, 1 carte
- Otte, 1995a, p. 513



#### **Distribution géographique**

**Côte d'Ivoire** (Couturier *et al.*, 1984 • Donskoff, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*)

Ce sont les seules signalisations.

#### **Iconographie**

**Habitus** (*im.*: Donskoff, 1986, ♂) - **Autres morph.** (Donskoff, 1986 • Grunshaw, 1990a) - **Anat.** (génit.: Donskoff, 1986, ♂♀ • Grunshaw, 1990a)

#### **Bio-écologie**

Couturier *et al.* (1984), dans leur étude sur la forêt de Taï, indiquent l'espèce caractéristique de la forêt

ombrophile associée à la haute canopée, ce qui semble très différent de l'espèce précédente.