

*Gerista* Bolívar I., 1905b, p. 233-234


Espèce-type : *Gerista dimidiata* Bolívar I., 1905b, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

### *Gerista dimidiata* Bolívar I., 1905

*Gerista dimidiata* Bolívar I., 1905b, p. 234-235

Holotype mâle, Guinée Équatoriale, Fernando Póo (= *Bioko ou Bioco*), MNCN Madrid



*Gerista dimidiata* mâle, d'après Dirsh (1958c)

#### Citations bibliographiques

*Gerista dimidiata*

- Cornes & Riley, 1972, p. 8
- Dirsh, 1958c, p. 52, 53, figs. 2-7 ~ 1965, p. 237, 238, fig. 182
- Hollis, 1975, p. 214, 219, fig. 54
- Jago, 1962, p. 148-149 (description de la femelle)
- Johnston, 1956, p. 257 ~ 1968, p. 174

*Gerista dimidiata* (suite)

- Kirby, 1910, p. 407
- Medler, 1980, p. 39
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 ~ 2006, p. 18, 147-148, 1 carte
- Otte, 1995a, p. 130
- Ramme, 1929, p. 333, fig. 49, pl. 7 : f. 12

#### Distribution géographique

**Bioko** (Bolívar I., 1905b • Hollis, 1975 • Ramme, 1929) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Hollis, 1975 • Jago, 1962 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006)

Hormis les signalisations du Nigeria (Jago), cette espèce n'est connue que par l'holotype.

Hollis (1975) émet l'hypothèse que les spécimens du Nigeria cités par Jago

(2 mâles et 2 femelles) puissent se rapporter à une espèce différente. Ceci n'a pas été étudié.



#### Iconographie

**Habitus** (im.: Dirsh, 1958c, 1965, ♂ • Ramme, 1929, ♂) - **Autres morph.** (Dirsh, 1958c, 1965 • Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂: Hollis, 1975)

#### Bio-écologie

Les très rares spécimens collectés ne permettent aucune information précise. Jago (1962) indique " a forest-edge species, living on broad leaved forest grasses ".