

Mabacris Donskoff, 1986, p. 209

Espèce-type : *Mabacris guillaumeti* Donskoff, 1986, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

***Mabacris guillaumeti* Donskoff, 1986**

Mabacris guillaumeti Donskoff, 1986, p. 209, 210-211, figs. 34, 35-46

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Forêt de Taï, MNHN Paris

Citations bibliographiques

Mabacris guillaumeti

- Couturier *et al.*, 1984, p. 156, 167-168, 170, figs. 34, 35-46
- Donskoff, 1986, p. 209, 210-211, figs. 34-46
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 ~ 2006, p. 20, 185, 1 carte
- Otte, 1995b, p. 15

Distribution géographique

Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Donskoff, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006)

L'holotype est la seule signalisation de cette espèce trouvée dans la forêt dense humide sempervirente de Taï, un des derniers vestiges de forêt primaire en Afrique de l'Ouest.

**Iconographie**

Habitus (*im.*: Donskoff, 1986, ♂) - **Autres morph.** (Donskoff, 1986) - **Anat.** (génit. ♂ : Donskoff, 1986)

Bio-écologie

Aucune information.

L'holotype a été obtenu par collecte immédiate après l'abattage d'arbres (voir Duviard *et al.*, 1984) et Couturier *et al.* (1984) pensent que cette espèce appartient au peuplement de la canopée, comme un autre Cyrtacanthacridinae *Taiacris couturieri*.