

Occidentosphena Kevan, 1956c, p. 111-112
 Espèce-type : *Parasphena ruandensis* Rehn, 1914, par désignation originale

Genre afrotropical comprenant deux espèces aptères.

Occidentosphena uvarovi (Rehn, 1942)

Parasphena uvarovi Rehn, 1942, p. 288, 290, 300-305, 306, figs. 5, 6, pl. 26 : f. 12, pl. 27 : f. 16.
 Holotype femelle, Cameroun, Ntem Plain (N'tem Ebene), ANS Philadelphie ? (holotype référencé sur site Internet ANSP 2007, mais statut du matériel non précisé sur site version avril 2009 ; MNHU Berlin selon OSF mais non recensé par DORSA).

Syn. *Parasphena granulata* Chopard, 1945, p. 174, 176, fig. 27. Holotype femelle, Cameroun, MNHN Paris
 [Kevan, 1948, p. 113, avec *Parasphena uvarovi*]
 [Kevan, 1956c, p. 112, avec *Occidentosphena uvarovi*, comb. nov.]

Citations bibliographiques

Parasphena granulata
 -- Chopard, 1945, p. 174, 176, fig. 27
 -- Dirsh, 1965, p. 127
 -- Johnston, 1956, p. 169
 -- Kevan, 1948, p. 113 (mise en synonymie avec *P. uvarovi*, note infrapaginale.)
Parasphena uvarovi
 -- Johnston, 1956, p. 172
 -- Kevan, 1948, p. 113 ~ 1951, p. 17
 -- Rehn, 1942, p. 288, 290, 300-305, 306, figs. 5, 6, pl. 26 : f. 12, pl. 27 : f. 16 ~ 1953, p. 125

Occidentosphena uvarovi
 -- Dirsh, 1965, p. 126, 127
 -- Johnston, 1968, p. 100, 103
 -- Kevan, 1956c, p. 112, comb. nov. ~ 1977, p. 403
 -- Kevan et al., 1974, p. 245, 248-249, 293, figs. 31c,d, pl. 7 : f. E-H
 -- Otte, 1994b, p. 39-40

Distribution géographique

Cameroun (Chopard, 1945 • Dirsh, 1965 • Kevan, 1948 • Kevan et al., 1974 • Rehn, 1942, 1953)

Ce sont les seules signalisations.



Iconographie

Habitus (im. ♀: Kevan et al., 1974, holotypes de *P. uvarovi* et *P. granulata* • Rehn, 1942, holotype de *P. uvarovi*) -

Autres morph. (Chopard, 1945 • Rehn, 1942) - **Anat.** (génit. ♀: Kevan et al., 1974)

Bio-écologie

Aucune information.