

Trichocatantops Uvarov, 1953a, p. 237
Espèce-type : *Catantops tukuyensis* Miller, 1925, par désignation originale


Genre afrotropical comprenant deux espèces, avec seulement *T. villosus* dans notre zone d'étude.

Clé Dirsh (1966, Angola, distinction entre *T. villosus* et *T. digitatus*, seule autre espèce du genre).

Trichocatantops villosus (Karsch, 1893)

Catantops villosus Karsch, 1893, p. 95 (clé), 99

Syntypes mâle(s), femelle(s), Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin. Lectotype mâle signalé par Dirsh (1970, p. 275)(DORSA : 2 syntypes, 1 mâle et 1 femelle)



Trichocatantops villosus femelle, d'après Mestre (1988)

- Syn.** *Anthermus swynnertoni* Uvarov, 1925a, p. 630-631. Holotype mâle, Zimbabwe, NHM Londres
[Uvarov, 1953b, p. 27, avec *Trichocatantops swynnertoni*]
[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]
Catantops tukuyensis Miller, 1925, p. 630-631, fig. 6. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres
[Uvarov, 1953b, p. 26, avec *Trichocatantops tukuyensis* (sic, erreur d'orthographe pour *tukuyuensis*)]
[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]
Catantops hirtus Miller, 1929, p. 90-91. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres
[Uvarov, 1953b, p. 27, avec *Trichocatantops hirtus*]
[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]
Catantops villosus violaceipennis Ramme, 1929, p. 431. Holotype mâle, Centrafrique, MNHU Berlin
(DORSA : + 1 paratype)
[Uvarov, 1953b, p. 26, avec *Trichocatantops violaceipennis*]
[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]
Catantops pachycerus Ramme, 1929, p. 431-432. Holotype femelle, Zanzibar, MNHU Berlin (DORSA : holotype femelle)
[Uvarov, 1953b, p. 27, avec *Trichocatantops pachycerus*]
[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]
Catantops simplex var. *elgonensis* Sjöstedt, 1933b, p. 21. Syntypes mâles(s), femelle(s), Mont Elgon
(frontière Kenya-Ouganda). Lectotype femelle (Dirsh, 1956a), NR Stockholm
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Trichocatantops tukuyensis* (sic, erreur orthographique)]



Citations bibliographiques

<i>Catantops villosus</i>	<i>Trichocatantops tukuyensis</i>	<i>Trichocatantops villosus</i> (suite)
-- Descamps, 1953, p. 605	-- Dirsh, 1965, p. 354, 355, fig. 279	-- Mestre, 1988, p. 140, 141, figs. 5-7, 1 carte
-- Karny, 1907, p. 320 (clé), 345	-- Johnston, 1968, p. 247	-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 ~ 2006, p. 20, 285-286, 1 carte
-- Karsch, 1893, p. 95 (clé), 99	-- Miller, 1925, p. 630-631, fig. 6	-- Mestre <i>et al.</i> , 2001, p. 318
-- Kirby, 1910, p. 480	<i>Trichocatantops villosus</i>	-- Oyidi, 1977, p. 17 ~ 1978, p. 8
-- Ramme, 1929, p. 482, 484	-- Chapman, 1962, p. 29	-- Roy, 1965, p. 623 ~ 1969a, p. 213 ~ 2003, p. 345-380, 387
<i>Catantops villosus tukuyensis</i> (sic)	-- Cornes & Riley, 1972, p. 10	-- Uvarov, 1953b, p. 26, 27, fig. 12
-- Ramme, 1929, p. 431	-- Delarze & Le Gall, 1989, p. 278	-- Dirsh, 1965, p. 354, 355
<i>Catantops villosus violaceipennis</i>	-- Dirsh, 1956a, p. 21, fig. 17 (carte) ~ 1965, p. 354, 355 ~ 1966, p. 237- 239, fig. 110 ~ 1970, p. 273-275, fig. 87	-- Johnston, 1956, p. 337 ~ 1968, p. 247
-- Ramme, 1929, p. 431, 482	-- Fishpool & Popov, 1984, p. [395] (section B non paginée)	-- Gillon, 1973a, p. 20, 54 ~ 974a, p. 145 ~ 1974b, p. 529 (clé)
<i>Trichocatantops digitatus</i> (Err. dét., non présent en Afrique de l'Ouest)	-- Gillon, 1973a, p. 20, 54 ~ 974a, p. 145 ~ 1974b, p. 529 (clé)	-- Jago, 1967b (clé), p. 263 ~ 1968, p. 268 ~ 1984, p. 353
-- Cornes & Riley, 1972, p. 10	-- Dirsh, 1956b (clé), p. 263 ~ 1968, p. 268 ~ 1984, p. 353	-- Johnstone, 1956, p. 337 ~ 1968, p. 247
-- Medler, 1980, p. 42	-- Le Gall & Gillon, 1989, p. 58, 60, 64	-- Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61
-- Oyidi, 1977, p. 5, 21 ~ 1978, p. 9, 11	-- Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61	-- Medler, 1980, p. 42
<i>Trichocatantops hirtus</i>	-- Mestre, 1988, p. 140, 141, figs. 5-7, 1 carte	
-- Uvarov, 1953b, p. 27, fig. 15		
<i>Trichocatantops swynnertoni</i>		
-- Uvarov, 1953b, p. 27, fig. 14		
<i>Trichocatantops tukuyensis</i> (sic)		
-- Dirsh, 1956a, p. 20, 21, figs. 13-16, 17 (carte) ~ 1956c, p. 275, pl. 34 : f. 5 ~ 1963b, p. 213		
-- Uvarov, 1953b, p. 26, 27, fig. 13		

Distribution géographique

Bénin (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Cameroun** (Descamps, 1953 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1973a, 1974a, 1974b • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • mat. exam.) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Guinée** (Dirsh, 1963b • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 2003) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1956a, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1953b) - **R. centrafricaine** (Ramme, 1929) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1965, 1969a) - **Togo** (Dirsh, 1956a, 1965, 1966, 1970 • Fishpool, *comm. pers.* • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968, 1984 • Karna, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.)

Espèce à vaste répartition, signalée via l'Afrique centrale jusqu'au Kenya à l'est et au Zimbabwe au sud.



Catantops tukuyuensis mâle, d'après Miller (1925)

Iconographie

Habitus (*im.*: Mestre, 1988 ♀ • Miller, 1925 ♂, sous *C. tukuyuensis*) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a, sous *T. tukuyuensis* (sic), 1965, sous *T. tukuyuensis*, 1966, 1970 • Uvarov, 1953b, sous *T. hirtus*, *T. swynnertonii*, *T. tukuyuensis* et *T. villosus*) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1965, sous *T. tukuyuensis*, 1970)

Bio-écologie

Espèce de savanes arbustives ou arborées.

Ainsi que l'indique Fishpool & Popov (1984), les données disponibles montrent une espèce univoltine avec passage de la saison sèche par les imagos (*cf.* en particulier Gillon, 1973a, 1974a ; Chapman, 1962 ; Jago, 1968, Le Gall & Mestre, 1986).

Les Catantopinae africains ont un régime alimentaire essentiellement non graminivore et les quelques éléments disponibles vont dans ce sens pour *T. villosus* (Le Gall & Gillon, 1989). Gillon l'indique comme s'alimentant, entre autres, sur un petit arbuste de savane, *Lippia adoensis* (Verbénacées).



Trichocatantops villosus, mâle et juvénile
(photos J. Mestre, Côte d'Ivoire)